

1457/144 (NL-âm/HSE67)

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**  
Lần đầu: 10/9/13

<b>CINARIZIN</b> 4 VI x 25 VIÊN NÉN	<b>CINARIZIN</b> 4 VI x 25 VIÊN NÉN   NAMHA PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ 415 Hàn Thuyên - Nam Định
	<p><b>CÔNG DỤNG:</b> Điều trị chứng chóng mặt, hoa mắt. Phòng ngừa say sóng, say tàu xe. Rối loạn tiền đình, rối loạn tuần hoàn não, tuần hoàn ngoại vi. LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem trong đơn hướng dẫn.</p> <p>SDK : Số Lô SX : Ngày SX : HD :</p>
<b>CINARIZIN</b> 4 VI x 25 VIÊN NÉN	<b>CINARIZIN</b> 4 VI x 25 VIÊN NÉN   NAMHA PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ 415 Hàn Thuyên - Nam Định
<p><b>CÔNG THỨC:</b> Cinarizin 25mg Tá dược vờ 1 viên <b>BẢO QUẢN:</b> Nơi khô, tránh ánh sáng. Nhiệt độ từ không quá 30°C</p>	<p><b>TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:</b> TCCS <b>ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM</b> <b>ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ</b> <b>DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.</b></p>

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
THSDH: Nguyễn Thị Thanh Bình

### MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

**CINARIZIN**  
10 VỈ x 25 VIÊN NÉN

**CINARIZIN**  
10 VỈ x 25 VIÊN NÉN

GMP  
  
NAMHA PHARMA


**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**  
415 Hàn Thuyên - Nam Định

**CÔNG DỤNG:**  
 Điều trị chứng chóng mặt, hoa mắt.  
 Phòng ngừa say sóng, say tàu xe.  
 Rối loạn tiền đình, rối loạn tuần hoàn não, tuần hoàn ngoại vi.

**LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**  
 Xem trong đơn hướng dẫn.

SDK :  
Số Lô SX:  
Ngày SX :  
HD :

**CINARIZIN**  
10 BLISTERS x 25 TABLETS

GMP  
  
NAMHA PHARMA

NAM HA PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY  
415 Hàn Thuyên - Nam Định

**CINARIZIN**  
10 BLISTERS x 25 TABLETS

**CÔNG THỨC:**  
 Cinnarizine 25 mg  
 Tá dược vừa đủ 1 viên

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** TCCS  
 ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM  
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
 TRƯỚC KHI DÙNG

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*ThS.DH. Nguyễn Thị Thanh Định*

DT

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ 415 HÀN THUYỀN - NAM ĐỊNH		
	<b>CINARIZIN</b> 50 vỉ x 25 viên nén		
Số lô SX: Ngày SX: HD :	Công thức: - Cinarizin 25 mg - Tá dược vừa đủ 1 viên	THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN	
Công dụng, liều dùng, chống chỉ định: Xem trong đơn hướng dẫn. Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.			
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG			
SDK:			

CÔNG TY CPDP NAM HÀ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
TASDH: Nguyễn Thị Thanh Bình

*Handwritten mark*

MẪU NHÃN VI XIN ĐĂNG KÝ



Số lô SX, Hạn dùng dập nổi trên vi



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC PHẨM NAM HÀ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
THSDH: *Hoàng Kim Tuyết*

*BT*

### TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

*Để xa tầm tay trẻ em*

*Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ*

## CINARIZIN

### CÔNG THỨC:

Cinarizin 25 mg

*Tá dược gồm: Tinh bột ngô, Lactose, Avicel, Sodium starch glyconat, Starch 1500, I K30, Magnesi stearat.*

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nén.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 4 vỉ x 25 viên, Hộp 10 vỉ x 25 viên, Hộp 50 vỉ x 25 viên

### ĐƯỢC ĐỘNG HỌC:

Thuốc được hấp thu qua đường tiêu hoá. Sau khi uống, Cinarizin đạt nồng độ đỉnh huyết tương từ 2 đến 4 giờ. Thời gian bán thải của thuốc là từ 3 – 6 giờ. Thuốc được bài tiết qua nước tiểu chủ yếu qua các chất chuyển hoá.

### ĐƯỢC LỰC HỌC:

- Cinarizin là thuốc kháng histamin (H1), có tác dụng chống tiết acetylcholin và an thần. Thuốc kháng histamin có thể chặn các thụ thể ở cơ quan tận cùng của tiền đình và ức chế hoạt động quá trình tiết histamin và acetylcholin.
- Cinarizin còn là chất đối kháng calci. Thuốc ức chế sự co tế bào cơ trơn mạch máu bằng cách chặn các kênh calci.

### CHỈ ĐỊNH:

Điều trị chứng chóng mặt, hoa mắt. Phòng ngừa say sóng, say tàu xe. Rối loạn tiền đình, loạn tuần hoàn não, tuần hoàn ngoại vi.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn cảm với Cinarizin hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Loạn chuyển hoá porphyrin.

### TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Rượu (chất ức chế hệ thần kinh trung ương), thuốc chống trầm cảm ba vòng: Sử dụng đồng thời với cinarizin có thể làm tăng tác dụng an thần của mỗi thuốc nêu trên hoặc của cinarizin.

### SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Chỉ dùng trong thời kỳ mang thai và cho con bú khi thật cần thiết, khi lợi ích điều trị mẹ trội hơn nguy cơ có thể xảy ra đối với thai nhi và trẻ nhỏ.

### TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc gây ngủ gà do đó không dùng khi lái xe và vận hành máy móc.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

*Thường gặp, ADR > 1/100*

Thần kinh trung ương: Ngủ gà.

Tiêu hóa: Rối loạn tiêu hóa.

Ít gặp,  $1/1000 < ADR < 1/100$

Thần kinh trung ương: Nhức đầu.

Tiêu hóa: Khô miệng, tăng cân.

Khác: Ra mồ hôi, phản ứng dị ứng.

Hiếm gặp,  $ADR < 1/1000$

Thần kinh trung ương: Triệu chứng ngoại tháp ở người cao tuổi hoặc khi điều trị dài ngày.

Tim mạch: Giảm huyết áp (liều cao).

**Ghi chú:** "Thông báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

**LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:**

- Rối loạn tuần hoàn não: Uống 1 viên/lần, ngày 3 lần.

- Rối loạn tuần hoàn ngoại vi: 2-3 viên/lần, ngày 3 lần.

- Say tàu xe: Uống 1 viên trước lúc khởi hành 30 phút, sau đó nếu cần cứ 6-8 giờ uống 1 viên. Trẻ em dùng nửa liều người lớn.

**THẬN TRỌNG:**

- Cũng như với những thuốc kháng histamin khác, cinnarizin có thể gây đau vùng thực quản. Uống thuốc sau bữa ăn có thể làm giảm kích ứng dạ dày. Cinnarizin có thể gây ngủ gục, đặc biệt lúc khởi đầu điều trị. Phải tránh những công việc cần sự tỉnh táo (ví dụ: lái xe) cho đến khi hết buồn ngủ. Tránh dùng cinnarizin dài ngày ở người cao tuổi, vì có thể gây tăng hoặc xuất hiện triệu chứng ngoại tháp, đôi khi kết hợp với cảm giác trầm cảm trong điều trị kéo dài.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:**

Chưa có tài liệu ghi nhận

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** Tiêu chuẩn cơ sở.



Nhà sản xuất  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**  
415 Hàn Thuyên Nam Định  
Tel: 0350.3649408. Fax: 0350.3644650



Nam Định, ngày tháng năm 2013  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

