

MẪU HỘP GIẤY



13cm

GMP-WHO

CLOTRIMAZOL

CLOTRIMAZOL

Mỗi viên đặt có chứa:

Clotrimazol100mg

7 cm



MEDIPHARCO
SDK:

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Chỉ định: Viêm âm đạo do nhiễm Candida, Trichomonas hoặc nhiễm các loại nấm khác.
Nhiễm khuẩn âm đạo do vi khuẩn nhạy cảm.

Chống chỉ định, Liều dùng và cách dùng, Các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Điều kiện bảo quản: Để nơi khô thoáng, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

1,5cm

6 Vaginal Tablets

GMP-WHO

CLOTRIMAZOL

Each vaginal tablet contains:

Clotrimazole100mg

Handwritten signature



MEDIPHARCO
Reg N°:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN - PLEASE READ PACKAGE INSERT BEFORE USING.

Số lô SX/ Lot:
Ngày SX/ Mfg. Date:
HĐ/ Exp. Date:



MEDIPHARCO


Nhà sản xuất:
CTY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPHARCO-TENAMYD
8 Nguyễn Trường Tộ - Tp. Huế - Việt Nam



<https://trungtamthuoc.com/>

<https://trungtamthuoc.com/>

MẪU VỈ



Hướng chạy của nhôm

ph

* Ghi chú: Số lô SX và hạn dùng được in mặt sau của vỉ thuốc.



MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CLOTRIMAZOL

Viên đặt âm đạo

CÔNG THỨC: Mỗi viên đặt âm đạo có chứa:

Clotrimazol:100mg

Tá dược: (Lactose, Pregelatinized rice starch, Microcrystalline cellulose, Magnesi stearat, Hydrogenated castor oil, Pregelatinised starch) vừa đủ1 viên

CHỈ ĐỊNH:

Viêm âm đạo do nhiễm Candida, Trichomonas hoặc nhiễm các loại nấm khác.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sỹ.

Đặt 1 viên vào âm đạo mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, dùng liên tục trong 7 ngày.

Nhúng viên thuốc vào nước đun sôi để nguội khoảng 20 - 30 giây. Sau đó đặt sâu vào âm đạo bằng dụng cụ đặt. Tốt nhất nên đặt ở tư thế nằm ngửa, đầu gối hơi gập, nằm yên khoảng 15 phút.

Không nên điều trị trong khi đang hành kinh.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Không dùng clotrimazol cho điều trị nhiễm nấm toàn thân.

Nếu có kích ứng hoặc mẫn cảm khi dùng clotrimazol, phải ngừng thuốc và điều trị thích hợp.

Tránh các nguồn gây nhiễm khuẩn hoặc tái nhiễm.

THỜI KỲ MANG THAI:

Chưa có đủ các số liệu nghiên cứu trên người mang thai trong 3 tháng đầu. Thuốc này chỉ được dùng cho người mang thai trong 3 tháng đầu khi có chỉ định rõ ràng của bác sỹ.

THỜI KỲ CHO CON BÚ:

Vẫn chưa biết liệu thuốc có bài tiết qua sữa không, thận trọng khi dùng cho người cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Tính tương kỵ hoặc các tương tác thuốc giữa Clotrimazol viên đặt âm đạo với các thuốc khác chưa được biết.

Thuốc Clotrimazol làm tăng nồng độ Tacrolimus trong huyết thanh.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN :

Các phản ứng tại chỗ bao gồm ngứa, dị ứng, kích ứng ở niêm mạc âm đạo.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG HỌC:

*** Dược lực học:**

Clotrimazol là thuốc chống nấm phổ rộng được dùng điều trị các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm các loài nấm gây bệnh khác nhau và cũng có tác dụng trên *Trichomonas*, *Staphylococcus* và *Bacteroides*. Không có tác dụng với *Lactobacilli*.

Cơ chế tác dụng của clotrimazol là liên kết với các phospholipid trong màng tế bào nấm, làm thay đổi tính thấm của màng, gây mất các chất thiết yếu nội bào dẫn đến tiêu hủy tế bào nấm.

*** Dược động học:**

Dùng đường âm đạo, clotrimazol rất ít được hấp thụ.

Sau khi đặt âm đạo viên nén clotrimazol - ¹⁴C 100 mg, nồng độ đỉnh huyết thanh trung bình chỉ tương đương 0,03 microgam clotrimazol/ml sau 1 - 2 ngày và xấp xỉ 0,01 microgam/ml sau 8 - 24 giờ nếu dùng 5 g kem clotrimazol - ¹⁴C 1%.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Phù nề, kích ứng niêm mạc khi đặt. Phải ngừng sử dụng thuốc.

LỜI KHUYẾN CÁO:

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Vỉ 6 viên, Hộp 1 vỉ.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.



CTY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPHARCO-TENAMYD
8 Nguyễn Trường Tộ - Tp. Huế - Việt Nam

MEDIPHARCO Tel: 054. 3823099 - 3827215 Fax: 054.3826077

Huế, ngày 22 tháng 12 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Phạm Chi Bình