

Clovucire

THÀNH PHẦN

Thành phần hoạt chất:

Metronidazol.....500 mg

Clotrimazol.....100 mg

Neomycin (*dưới dạng Neomycin sulfat*).... 56.000 IU

Tá dược: Aerosil, suphocare NAL vừa đủ 1 viên

MÔ TẢ DẠNG BÀO CHẾ

Viên đạn đặt âm đạo, hình thủy lôi, màu trắng đục, chảy và mềm ra ở $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

CHỈ ĐỊNH

Các trường hợp viêm nhiễm phụ khoa do nhiều nguyên nhân khác nhau: viêm âm đạo do vi khuẩn sinh mù thông thường, viêm âm đạo kèm huyết trắng, viêm âm đạo do Trichomonas, do nấm Candida albicans, do nguyên nhân hỗn hợp: nhiễm Trichomonas và nấm men

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

Dành cho người lớn, đặt âm đạo..

Liều dùng: đặt 1 viên/lần vào buổi tối trước khi đi ngủ, dùng liên tục trong 10 ngày liền. Trong trường hợp nhiễm nấm, thời gian điều trị có thể lên tới 20 ngày.

Cách dùng: đặt viên thuốc vào sâu âm đạo. Bệnh nhân nên ở tư thế nằm ít nhất 15 phút sau khi đặt thuốc.

Trong trường hợp quên thuốc: đặt ngay thuốc nếu có thể. Tuy nhiên, nếu thời điểm này quá gần với thời gian dùng viên tiếp theo, bỏ qua liều quên và đặt viên tiếp theo như bình thường.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Ba tháng đầu của thai kỳ.

Không nên dùng thuốc này đồng thời với disulfiram, thuốc diệt tinh trùng

Bệnh nhân bị tắc ruột, viêm loét đường tiêu hóa.

THẬN TRỌNG

Thành phần tá dược béo của viên CLOVUCIRE có thể làm giảm tác dụng của bao cao su hoặc màng ngăn tránh thai, do đó không nên dùng các sản phẩm này

trong quá trình điều trị với CLOVUCIRE.

Tiêm âm đạo, băng vệ sinh, các dung dịch vệ sinh cá nhân có pH acid không nên sử dụng trong thời gian điều trị với CLOVUCIRE vì chúng có thể thúc đẩy nấm phát triển.

Không nên quan hệ tình dục qua đường âm đạo trong quá trình điều trị với CLOVUCIRE

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KÝ CỦA THUỐC

Tương tác thuốc

Không sử dụng bao cao su hoặc màng ngăn tránh thai khi đang điều trị với CLOVUCIRE, vì các tá dược béo có trong viên đặt có khả năng làm giảm tác dụng tránh thai.

Tương kỵ của thuốc: Do chưa có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với thuốc khác.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Mang thai: Vì có chứa neomycin, có thể gây độc tính ở tai hoặc đi vào máu, không nên dùng trong thời kỳ mang thai

Cho con bú: Metronidazol qua được sữa mẹ, vì vậy tránh sử dụng thuốc này trong thời gian cho con bú

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR).

Khi dùng viên đặt CLOVUCIRE tác dụng không mong muốn thường hiếm khi xảy ra và nhẹ như: tăng nhạy cảm và nóng rát âm đạo. Các tác dụng khác như đắng miệng, buồn nôn, nôn xuất hiện khi dùng CLOVUCIRE cùng metronidazol đường uống

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Chưa có ghi nhận trường hợp quá liều nào khi sử dụng viên đặt âm đạo CLOVUCIRE

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vỉ x 6 viên đặt âm đạo, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C .

TIÊU CHUẨN: TCCS.