



THUỐC BÁN THEO ĐƠN

Colflox

THUỐC NHỎ MẮT



PHARMEDIC

CÔNG THỨC: mỗi lọ chứa:

- Ofloxacin 15 mg
- Tá dược: Acid hydrocloric, natri hydroxyd, natri clorid, phenylmercuric nitrat, nước cất vừa đủ 5 ml.

CHỈ ĐỊNH

Các bệnh nhiễm trùng phần ngoài mắt do các chủng nhạy cảm với Ofloxacin:

- Viêm kết mạc, loét giác mạc, viêm túi lệ.
- Viêm mí mắt, viêm sụn mí, mọt lệ (chấp, lệ mắt)

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

- Nhỏ 2 giọt mỗi mắt, ngày 4 lần.
- Dùng thuốc quá 15 ngày nên có ý kiến của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Dị ứng với ofloxacin, hay các kháng sinh khác thuộc nhóm quinolon.
- Trẻ em dưới 1 tuổi.

LƯU Ý - THẬN TRỌNG: Không nên gắn kính sát trùng trong thời gian dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa thấy báo cáo.

PHỤ NỮ MANG THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ

Không nên dùng trong thời kỳ mang thai và cho con bú trừ khi vì lợi ích điều trị.

TÁC DỤNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa thấy báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Cảm giác nóng rát mắt tạm thời.

- * Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Chưa thấy báo cáo.

DƯỢC LỰC HỌC

- Thuốc nhỏ mắt Ofloxacin là dung dịch đẳng trương vô trùng chứa hoạt chất Ofloxacin
- Ofloxacin là một dẫn xuất fluoroquinolon hoạt phổ kháng khuẩn rộng bao gồm các vi khuẩn gram dương, vi khuẩn gram âm và vi khuẩn kỵ khí. Ofloxacin ức chế DNA-gyrase của vi khuẩn là enzym cần thiết trong phân bào và sao chép của vi khuẩn.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

- Sau đợt điều trị 10 ngày với thuốc nhỏ mắt ofloxacin 0,3%, nồng độ trung bình ofloxacin trong huyết thanh đo được từ 0,4ng/ml - 1,9ng/ml. Nồng độ tối đa ofloxacin trong huyết thanh đạt được sau 10 ngày nhỏ thuốc vào mắt thấp hơn 1000 lần sau khi uống liều tiêu chuẩn ofloxacin.
- Ofloxacin dùng tại chỗ thải trừ ở thận chủ yếu dạng không đổi.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NEU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.

TRÌNH BÀY : Hộp 1 lọ 5ml

TIÊU CHUẨN: TCCS

HẠN DÙNG: 30 tháng kể từ ngày sản xuất

BẢO QUẢN:

- Ở nhiệt độ không quá 30°C.
- Đậy nắp kín ngay sau khi dùng.
- Chỉ sử dụng trong 15 ngày sau khi mở nắp.

CTCP DPDL PHARMEDIC: 367 Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Sản xuất tại nhà máy GMP-WHO: 1/67 Nguyễn Văn Quá, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.