

148/149

Thành phần: cho 1 gói x 5g:
Sa nhân0,6g
Liên nhục0,6g
Hoài sơn0,4g
Mạch nha0,4g
Y dĩ0,4g

Cao đặc được liệu 1,5g
Tương đương với: Đảng sâm 1,7g; Bạch truật 1,7g; Bạch linh 1,7g; Cát cánh 1,0g; Cam thảo 0,8g; Trần bì 0,8g; Đường kính vđ 5g.

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD
Tiêu chuẩn: TCCS.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Hộp 10 gói x 5g cốm
Lần đầu: 19/.../2014

GIỚI THIỆU
CỐM BỔ TỖ P/H
KIẾN TỖ - ÍCH KHÍ



CỐM BỔ TỖ P/H

KIỆN TỖ - ÍCH KHÍ

DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP

- Trẻ em chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng
- Rối loạn tiêu hóa, phân sống và nát
- Loạn khuẩn đường ruột, tiêu chảy kéo dài



Chỉ định: Cốm bổ tỳ P/H có tác dụng kiện tỳ, ích khí. Thuốc được dùng trong các trường hợp trẻ em chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn, rối loạn tiêu hóa, phân sống và nát, loạn khuẩn đường ruột, tiêu chảy kéo dài.
Liều dùng - cách dùng - chống chỉ định:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp.



Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HUNG
Trụ sở: 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy: CCN Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
www.dongduocphuchung.com.vn * Email: phuchungph@vnn.vn
Tel: 04. 33824177 - 33826222 * Fax: 04. 33978024

- Trẻ em chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng
 - Rối loạn tiêu hóa, phân sống và nát
 - Loạn khuẩn đường ruột, tiêu chảy kéo dài
- DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP

CỐM BỔ TỖ P/H

KIỆN TỖ - ÍCH KHÍ



Hộp 10 gói x 5g cốm

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

133.67.23

Gói 5g cốm

CỐM BỔ TỖ P/H

KIỆN TỖ
ÍCH KHÍ

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

Thành phần: cho 1 gói x 5g: Sa nhân 0,6g; Liên nhục 0,6g; Hoài sơn 0,4g; Mạch nha 0,4g; Y dĩ 0,4g; Cao đặc được liệu 1,5g (Tương đương với: Đảng sâm 1,7g; Bạch truật 1,7g; Bạch linh 1,7g; Cát cánh 1,0g; Cam thảo 0,8g; Trần bì 0,8g); Đường kính vđ 5g.

Chỉ định: Cốm bổ tỳ P/H có tác dụng kiện tỳ, ích khí. Thuốc được dùng trong các trường hợp trẻ em chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn, rối loạn tiêu hóa, phân sống và nát, loạn khuẩn đường ruột, tiêu chảy kéo dài.

Liều dùng - cách dùng - chống chỉ định:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HUNG

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD

Thành phần: cho 1 gói x 10g:
 Sa nhân1,2g
 Liên nhục1,2g
 Hoài sơn0,8g
 Mạch nha0,8g
 Ý dĩ0,8g

Cao đặc được liệu 3,0g
 Tương đương với: Đảng sâm
 3,4g; Bạch truật 3,4g; Bạch
 linh 3,4g; Cát cánh 2,0g; Cam
 thảo 1,6g; Trần bì 1,6g; Đường
 kính vđ 10g.

SĐK:
 Số lô SX:
 Ngày SX:
 HD
Tiêu chuẩn: TCCS.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Hộp 10 gói x 10g cốm

CỒM BỔ TỖ P/H
 KIẾN TỖ - ÍCH KHÍ



CỒM BỔ TỖ P/H

KIẾN TỖ - ÍCH KHÍ

DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP

- Trẻ em chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng
- Rối loạn tiêu hóa, phân sống và nát
- Loạn khuẩn đường ruột, tiêu chảy kéo dài

Chỉ định: Cốm bổ tỳ P/H có tác dụng kiến tỳ, ích khí.
 Thuốc được dùng trong các trường hợp trẻ em chán ăn,
 còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn, rối loạn tiêu
 hóa, phân sống và nát, loạn khuẩn đường ruột, tiêu
 chảy kéo dài.

Liều dùng - cách dùng - chống chỉ định:
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp.



Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
 Trụ sở: 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
 Nhà máy: CCN Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
 www.dongduocphuchung.com.vn * Email: phuchungph@vnn.vn
 Tel: 04. 33824177 - 33826222 * Fax: 04. 33978024



DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP

- Trẻ em chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng
- Rối loạn tiêu hóa, phân sống và nát
- Loạn khuẩn đường ruột, tiêu chảy kéo dài

KIẾN TỖ - ÍCH KHÍ

CỒM BỔ TỖ P/H

Hộp 10 gói x 10g cốm



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 Để xa tầm tay trẻ em

133.67.23

Gói 10g cốm

CỒM BỔ TỖ P/H

**KIẾN TỖ
 ÍCH KHÍ**



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 Để xa tầm tay trẻ em

Thành phần: cho 1 gói x 10g: Sa nhân 1,2g; Liên nhục
 1,2g; Hoài sơn 0,8g; Mạch nha 0,8g; Ý dĩ 0,8g; Cao đặc
 được liệu 3,0g (Tương đương với: Đảng sâm 3,4g; Bạch
 truật 3,4g; Bạch linh 3,4g; Cát cánh 2,0g; Cam thảo 1,6g;
 Trần bì 1,6g); Đường kính vđ 10g.

Chỉ định: Cốm bổ tỳ P/H có tác dụng kiến tỳ, ích khí.
 Thuốc được dùng trong các trường hợp trẻ em chán ăn,
 còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn, rối loạn tiêu hóa,
 phân sống và nát, loạn khuẩn đường ruột, tiêu chảy kéo
 dài.

Liều dùng - cách dùng - chống chỉ định:
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

SĐK:
 Số lô SX:
 Ngày SX:
 HD

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

CỐM BỔ Tỳ P/H

Thành phần:

Thành phần	Cho 1 gói x 5g	Cho 1 gói x 10g
Sa nhân (<i>Fructus Amomi</i>)	0,6g	1,2g
Liên nhục (<i>Semen Nelumbinis nuciferae</i>)	0,6g	1,2g
Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	0,4g	0,8g
Mạch nha (<i>Fructus Hordei germinatus</i>)	0,4g	0,8g
Ý dĩ (<i>Semen Coicis</i>)	0,4g	0,8g
Cao đặc dược liệu (<i>Extracta</i>) tương đương với:	1,5g	3,0g
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	1,7g	3,4g
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>)	1,7g	3,4g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	1,7g	3,4g
Cát cánh (<i>Radix Platycodi grandiflori</i>)	1,0g	2,0g
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	0,8g	1,6g
Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>)	0,8g	1,6g
Đường kính (<i>Saccharum</i>)	vừa đủ 5g	vừa đủ 10g

Dạng bào chế: Thuốc cốm.

Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 10g; hộp 10 gói x 5g.

Chỉ định:

Cốm bổ tỳ P/H có tác dụng kiện tỳ, ích khí. Thuốc được dùng trong các trường hợp trẻ em chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn, rối loạn tiêu hóa, phân sống và nát, loạn khuẩn đường ruột, tiêu chảy kéo dài.

Cách dùng & liều dùng:

- Liều dùng: Ngày uống 2 - 3 lần:
Trẻ em dưới 6 tuổi, mỗi lần 1 gói 5g hoặc 1/2 gói 10g.
Trẻ em từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 1,5 gói 5g hoặc 3/4 gói 10g.
Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 2 gói 5g hoặc 1 gói 10g.
- Hòa thuốc vào nước ấm, khuấy cho thuốc phân tán đều rồi uống.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định:

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Tương tác với các thuốc khác:

Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Email: phuchungph@vnn.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hưng

CÔNG TY
TNHH
ĐÔNG DƯỢC
PHÚC HƯNG
HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI