



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CỐM CẢM XUYỀN HƯƠNG YÊN BÁI

<https://trivietnamthuoc.com/>

Tên thuốc: Cốm CẢM XUYỀN HƯƠNG

Khuyến cáo:

- "Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"
- "Để xa tầm tay trẻ em"
- "Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Thành phần công thức cho 1 gói:

Thành phần hoạt chất

Cao khô hỗn hợp

(tương đương với các dược liệu:

Xuyên khung
Bạch chỉ
Hương phụ
Quế chi
Sinh khương
Cam thảo bắc

Tên khoa học

Hàm lượng

0.2 g

Rhizoma Ligustici wallichii 600 mg
Radix Angelicae dahuricae 700 mg
Rhizoma Cyperi 600 mg
Ramulus Cinnamomi 100 mg
Rhizoma Zingiberis 25 mg
Radix Glycyrrhizae 25 mg)

Thành phần tá dược (Saccharin, Lactose, Na CMC, Natri benzoat, Glucose):

Vd 2 g

Dạng bào chế: Thuốc cốm.

Quy cách đóng gói: Thuốc được đóng 2 g/ gói, 20 gói + 1 tờ hướng dẫn sử dụng / 1 hộp giấy cứng.

Chỉ định: Điều trị các trường hợp cảm cúm, cảm lạnh, nhức đầu, hắt hơi, sổ mũi do cảm lạnh. Thuốc dùng cho cả người lớn và trẻ em.

Liều dùng và cách dùng:

Liều dùng:

- Trẻ em từ 6 tháng đến 1 tuổi: 1 gói/lần, ngày 2 lần.
- Trẻ em từ 1-5 tuổi: 1 gói/lần, ngày 3 lần.
- Trẻ em từ 5-12 tuổi: 2 gói/lần, ngày 2 lần.
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên và người lớn: 2 gói/lần, ngày 3 lần.

Cách dùng: Nhai cốm trực tiếp hoặc hoà cốm với nước ấm rồi uống.

Ghi chú:

- Sau khi uống thuốc nên ăn nhẹ một bát nhỏ cháo hành còn nóng để tăng hiệu quả điều trị.
- Một đợt dùng thuốc từ 3-5 ngày.

Chống chỉ định: Không dùng cho người đang chảy máu và phụ nữ có thai. Người đang ở trạng thái nhiệt, người đã tháo đường.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Mặc dù ít khi xảy ra nhưng không loại trừ trường hợp bệnh nhân có thể mắc bệnh cúm do các loại virus nguy hiểm như virus cúm lợn, cúm gia cầm và một số loại virus cúm A khác, trong quá trình điều trị, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh để phát hiện và xử trí kịp thời.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Trường hợp phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Tương tác của thuốc:

- Thuốc có thể bị giảm tác dụng nếu dùng đồng thời với các thuốc hoặc món ăn có tính hàn lạnh, do vậy không

dùng đồng thời với các thuốc có tính hàn lạnh và tránh ăn hải sản, các món ăn có tính hàn lạnh khi dùng thuốc.

- Chưa ghi nhận được các tài liệu hoặc báo cáo nào về tương tác của thuốc với các thuốc tây y, nhưng nếu phải dùng đồng thời với thuốc tây y thì tốt nhất nên uống cách nhau 2h.

Tương kỵ của thuốc: Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn: Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Phải thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi có bất cứ dấu hiệu bất thường nào xảy ra khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Bảo quản: Nơi khô, thoáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS



Sản xuất bởi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
Địa chỉ: 725- Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái
Tel: 0216 3852 523 - Fax: 0216 3850 364



BEPHARCO

Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
Địa chỉ: Số 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, TP.Bến Tre
VPĐD: Số 11 Nguyễn Trọng Quyền, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM.
Tel: 028 36220205/ Fax: 028 39610613
Email: bepharco.vietnam@bepharco.com
Website: www.bepharco.com