

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

1. TÊN THUỐC: CỒN IOD 1%

2. CÁC DẤU HIỆU LƯU Ý VÀ KHUYẾN CÁO KHI DÙNG THUỐC

Để thuốc sát khuẩn tốt cho trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

3. THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC: Cho 1 lọ:

Dược chất: Iod 1% (kl/tt)
Kali iodid 1% (kl/tt)

Tá dược: Ethanol 96%, Propylen glycol, Nước tinh khiết vừa đủ.

4. DẠNG BẢO CHẾ: Dung dịch dùng ngoài.

5. CHỈ ĐỊNH, ĐIỀU TRỊ

- Sát trùng trước khi phẫu thuật, tiêm.

6. CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG

Theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc theo cách dùng sau:

Trước khi tiêm hoặc phẫu thuật, bôi trước 1 phút đối với da ít tuyến bã nhờn, trước 10 phút với da nhiều bã nhờn.

7. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người có tiền sử không dung nạp iod, tránh bôi lên mắt.
- Trẻ em dưới 2 tuổi.
- Phụ nữ có thai và đang cho con bú.

8. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Nếu dùng lặp lại và kéo dài có thể bị quá liều iod dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp.

9. SỬ DỤNG CHO NGƯỜI MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Không dùng.

10. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có báo cáo.

11. TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Không bền trong môi trường kiềm, tương tác với các hợp chất có thủy ngân.

12. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR)

Dùng với vết thương rộng có thể gây phản ứng toàn thân:

Thường gặp có thể gây nhiễm acid chuyển hóa, tăng natri huyết và tổn thương chức năng thận. Đối với tuyến giáp: có thể gây giảm khả năng giáp. Giảm bạch cầu trung tính (ở người bệnh bị bỏng nặng). Co giật (ở người bệnh điều trị kéo dài).

13. QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Cần ngừng điều trị cồn iod. Các triệu chứng ngộ độc iod mất nhanh sau khi ngừng dùng cồn iod.

Trong trường hợp phải điều trị triệu chứng và hỗ trợ, chú ý đặc biệt đến cân bằng điện giải, chức năng thận và tuyến giáp.

14. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Lọ 20 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml, chai 650 ml, có nhãn kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

15. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC

Điều kiện bảo quản: Đựng trong lọ màu, nút kín, nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hạn dùng sau khi mở nắp: 2 tháng

16. TÊN, ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

Địa chỉ văn phòng: 273 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 192 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02436557832