



## CÒN XOA BÓP JAMDA

Tiêu chuẩn: TCCS  
Trình bày: Hộp 1 lọ xịt 50ml  
Công thức: Cho 50ml

Dịch chiết được liệu	45 ml
Tương đương 5 g dược liệu gồm	
Ô đầu ( <i>Radix Aconiti</i> )	500mg
Địa liên ( <i>Rhizoma Kaempferiae galangae</i> )	500mg
Đại hồi ( <i>Fructus Illicii veri</i> )	500mg
Quế ( <i>Cortex Cinnamomi</i> )	500mg
Thiên niên kiện ( <i>Rhizoma Homalomenae occultae</i> )	500mg
Uy linh tiên ( <i>Radix et rhizoma Clematidis</i> )	500mg
Mã tiền ( <i>Semen Strychni</i> )	500mg
Huyết giác ( <i>Lignum Dracaenae cambodianae</i> )	500mg
Xuyên khung ( <i>Rhizoma Ligustici wallichii</i> )	500mg
Tế tân ( <i>Herba Asari</i> )	500mg
Methyl salicylat ( <i>Methylis salicylas</i> )	5ml

### Chỉ định:

- Đau nhức các khớp xương cơ gân bắp thịt, đau lưng mỏi gối, đau vai gáy, đau thần kinh ngoại biên.
- Sưng đau bầm tím do sang chấn.
- Cúm lạnh.

### Cách dùng - Liều dùng:

- Xịt thuốc lên chỗ đau và xoa bóp, ngày 3 - 4 lần.

### Chống chỉ định:

- Không xịt thuốc vào vết thương hở, mắt mũi miệng, vùng vú khi cho con bú.
- Không được uống.
- Không dùng cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 2 tuổi.

### Lưu ý:

- Lắc trước khi dùng.
- Rửa sạch tay sau khi xoa bóp chỗ đau.


### Tác dụng không mong muốn:

- Chưa thấy có tác dụng không mong muốn của thuốc
- Nếu có bất thường khi dùng thuốc cần ngừng ngay và báo cho dược sỹ hoặc bác sỹ biết để xử lý.

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC



Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO  
Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên  
Tel: (0321) 3791016 - Fax: (0321) 3991828  
PHÓ CỤC TRƯỞNG  
Nguyễn Việt Hùng