



CÔNG TY
HIỂN DƯỢC PHẨM
CỐT LÔNG

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

ĐC: Km 10, Thôn 10
Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Hòa,
Tỉnh Quảng Bình

Biên bản kê đơn

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

CORTEBOIS®

Kem bôi da

Thành phần: mỗi chai 50g chứa

- Dexamethason acétat 1mg

- Cloxytetraxin 100mg

Ti thể màu đỏ 1 viên

(Chứa các chất: Acid stearic, cetyl alcohol, methyl paraben, propyl glycol, butyl hydroxytol, methylparaben).

ĐANG BẢO QUẢN: Kem bôi da

CÁCH SỬ DỤNG: Bôi 1-2 lần/ngày

Chỉ định: Các bệnh ngoài da cấp tính và mạn tính (chẩn đoán và xử lý ngoài da) như: viêm da tiếp xúc, viêm da dị ứng, viêm da tiết bã, viêm da chàm, vẩy nến, ngứa.

CÁC CÔNG DỤNG KHÁC:

- Giảm ngứa, thoa da ngứa, ngứa da tiếp xúc, ngứa da tiết bã, ngứa da chàm, ngứa da dị ứng, ngứa da chàm, ngứa da tiết bã.

- Giảm viêm da tiếp xúc, viêm da dị ứng, viêm da tiết bã, viêm da chàm, ngứa.

- Thoa da ngứa 1-2 lần/ngày, không dùng bôi 1 ngày cho một đợt điều trị.

Biện pháp xử lý hàng hóa của máy thuốc:

Chống chỉ định: Các bệnh về mắt hoặc các bệnh khác của thuốc

miễn nhiễm ngoài da (do vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng).

Chống chỉ định: các bệnh về mắt, ngứa da tiết bã, ngứa da chàm.

Tăng cảm ứng dexamethason hay cloxytetraxin.

Tại da tổn thương.

Chẩn đoán các bệnh khác:

không nên thoa kem này, nếu cần điều trị, nên dùng kem bôi da khác, không nên thoa kem này 1-2 lần/ngày.

- Không nên bôi kem này lên da bị tổn thương của mắt.

Phụ nữ có thai: Dexamethason có thể đi qua nhau thai. Không dùng cloxytetraxin cho phụ nữ mang thai gần đến kỳ sinh hoặc đang nuôi con bú vì có thể xảy ra những tác dụng độc hại cho thai nhi (chẩn đoán và xử lý ngoài da) như: viêm da tiếp xúc, viêm da dị ứng, viêm da tiết bã, viêm da chàm, ngứa.

Phụ nữ cho con bú: Dexamethason, cloxytetraxin phân bố vào trong sữa. Phải dùng thận trọng khi cho con bú (chẩn đoán và xử lý ngoài da) như: viêm da tiếp xúc, viêm da dị ứng, viêm da tiết bã, ngứa.

Mỹ phẩm của thuốc: Các chất có thể gây kích ứng da. Thận trọng khi thoa kem này lên da bị tổn thương của mắt.

Chưa ghi nhận tương tác thuốc: Tuy nhiên, không dùng chung kem này với các kem thoa da khác.

Tác dụng không mong muốn

- Phản ứng dị ứng: ngứa da, nổi mẩn ngứa.

- Dùng lâu ngày có thể gây loét da, loét mắt, viêm mắt.

- Khi dùng vào da tổn thương có thể gây ra chế biến tương thích.

- Các dị ứng ngoài da: ngứa da, nổi mẩn ngứa, ngứa da tiết bã, ngứa da chàm, ngứa.

- Không nên thoa kem này 1-2 lần/ngày, không dùng bôi 1 ngày cho một đợt điều trị.

Thận trọng khi thoa kem này lên da bị tổn thương của mắt.

ĐƯỢC LƯU HỒI:

Dexamethason là hexamethylsperactone, cloxytetraxin tổng hợp, đây đều là hàng hóa ngoại nhập. Các dexamethason là hàng hóa nhập khẩu từ các nhà sản xuất nước ngoài, được nhập khẩu và lưu trữ tại kho của Công ty. Các dexamethason là hàng hóa nhập khẩu từ các nhà sản xuất nước ngoài, được nhập khẩu và lưu trữ tại kho của Công ty.



[TRUNG TAM THUOC.COM](https://trungtamthuoc.com/)

Dexamethason có tác lực dược chính của glucocorticoid là chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch, các tác dụng này còn bằng độ giải trí nó ở. Về hoạt lực chống viêm, dexamethason mạnh hơn hydrocortison 30 lần, mạnh hơn prednisolon 7 lần.

Dexamethason thường có tác dụng như kháng, nhưng có thể gây thuận ở nồng độ cao hoặc đối với những vi khuẩn nhạy cảm với Dexamethason ức chế tổng hợp protein ở những vi khuẩn nhạy cảm bằng cách gắn vào tiểu thể 80S của ribosom. Thuốc có công hiệu tác dụng với taphozoon, chlamydia, bacillus, ascaritomyia và histoplasma.

ĐƯỢC DÙNG HỢC

Dexamethason được tiếp thu rất nhanh ở vị trí tác dụng thuốc vì sau đó được phân bố vào tất cả các mô trong cơ thể. Thuốc cũng liên kết với protein huyết tương (tới 77%) và chủ yếu là albumin. Thuốc được hấp thụ nhanh gan, liên kết các tuyến thượng thận. Chuyển hóa ở gan thành các chất có chủ yếu qua nước tiểu, liên kết ở dạng steroid không liên hợp. Nửa đời hoạt động là 3,5 - 4,5 giờ, nhưng khi sử dụng tác dụng, thường dùng nửa đời sinh học. Nửa đời sinh học của dexamethason là 30 - 34 giờ.

Dexamethason tác lên đồng tế bào, dexamethason được tiếp thu vào tế bào dexamethason phân bố rộng rãi trong các mô lớn mô cơ thể và dạ, tế bào máu tủy, dịch cổ trướng, dịch màng phổi, huyết dịch, thủy dịch và dịch tinh. Dexamethason bị chuyển hóa chủ yếu ở gan do glucosyl transferase. Một lượng nhỏ dexamethason dưới dạng không liên kết tự do trong nội bào phân bố vào mô cũng nhiều.

QUẢ LIỀU VÀ DƯ THỂ

Tiếp xúc quá liều có thể hoặc dùng ngắn là nên thận trọng hoặc quá liều tạo dị tật. Tác dụng hợp ngoại hình quá nhạy cảm với corticosteroid, gây dị tật. Lúc sử dụng điều trị, tránh dùng. Tự nhiên, dùng tạo dị tật tạo nên dùng có thể gây ức chế tuyến thượng thận.

Xét nghiệm nước tiểu định lượng thuốc.

ĐẶC ĐIỂM: Không độc tính, hiệu độ dưới 30%, tránh ánh sáng.

ĐỐI THUẬN VÀ CHỈ ĐỊNH TỰ NHIÊN

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN ẮP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

TRƯỚC KHI CHỈ ĐỊNH: THẢO DUYỆN CỦA BÁC SĨ

HẾT CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP BÁC SĨ KHÔNG TẠC DUYỆN CHỖA MUAU MUAU LẬP PHẢI CHỈ ĐỊNH DÙNG TRƯỚC.

VPC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐUÔI LÔNG
HỒ CHÍ MINH: 150 Đường 1/8/1 - Phường 8 - TP. Hồ Chí Minh