


400/0142

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu:

~~7/12/2013~~
8/11/2013



3. Mẫu nhãn hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng:



4. Mẫu nhãn chai 100 viên nang cứng

GMP - WHO

CYNAPHYTOL

Giải Độc Gan Thông Mật Lợi Tiểu Nhuận Trào



100 Viên nang cứng



THÀNH PHẦN:
Bao Aistle (Extractum Cynarae scolym) 300mg
(Tương đương 375mg cao độc actisô)
Ta được vừa đủ 1 viên nang cứng

CÔNG DỤNG: Giải độc gan, thông mật, lợi tiểu, nhuận tràng.

CHỈ ĐỊNH:
- Cynaphytol được dùng trong các trường hợp viêm gan, thận cấp và mãn tính.
Người bị sỏi mật, tiêu hóa kém.
- Điều trị các tình trạng di ứng do gan như: mụn nhọt, nổi mề đay, mẩn ngứa.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Uống trước bữa ăn, dùng liên tục 10 - 20 ngày/tháng.
- Người lớn: uống 2 - 3 viên/ lần x 2 - 3 lần/ ngày.
- Trẻ em: Uống 2 - 4 viên/ ngày, hoặc theo chỉ định của Bác sĩ.

CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Sản xuất và phân phối bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
Địa chỉ: 6A Ngô Quyền, P.6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Tel: 063 383 2020 - 382 4167 *Fax: 063 382 2369



Tiêu chuẩn SX: TCCS (Specifications, Manufacturer's)
Số ĐK (Reg. No.):
Số lô SX (Lot No.):
Ngày SX (Mfg. Date):
Hạn SD (Exp. Date):



5. Mẫu hộp 1 chai x 100 viên nang cứng:



Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc CYNAPHYTOL:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

OMP - V910

CYNAPHYTOL

Giải Độc Gan Thũng Mật Lợi Tiểu Nhuận Tráng

THÀNH PHẦN:

- Cao Actisô (*Extractum Cynarae scolymifoliae*) 300mg
(Tương đương 375mg cao độc actisô)
- Tá dược vừa đủ 1 viên nang cứng
(Tá dược: *Calcii phosphat tribasic, tinh bột bắp, magnesi stearat, aerosil 200*)

CÔNG DỤNG:

- Giải độc gan, thũng mật, lợi tiểu, nhuận tràng.

CHỈ ĐỊNH:

- Cynaphytol được dùng trong các trường hợp viêm gan, thận cấp và mãn tính. Người bị sỏi mật, tiểu hóa kém.
- Điều trị các tình trạng dị ứng do gan như: mụn nhọt, nổi mề đay, mẩn ngứa.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG: Uống trước bữa ăn, dùng liên tục 10 - 20 ngày/tháng.

- Người lớn: uống 2 - 3 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày.
- Trẻ em: Uống 2 - 4 viên/ngày, hoặc theo chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Tác ồng dẫn mật, viêm tắt mật, tỷ vị hư hàn, tiêu chảy hay dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Thuốc có thể gây nhuận tràng nhẹ.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không có.

DÙNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa có báo cáo.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Không được dùng quá liều chỉ định.

BẢO QUẢN: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 2 vi hoặc 5 vi x 20 viên nang cứng.
- Hộp 1 chai x 100 viên nang cứng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn dùng.

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: Tiêu chuẩn cơ sở.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
NẾU CẦN THÔNG TIN, HÃY HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HAY DƯỢC SĨ

Sản xuất và phân phối bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG
LADOPHAR

Địa chỉ: 6A Ngô Quyền, Phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Tel: 063 383 2020 - 382 4167 *Fax: 063 382 2369
Website: ladopharcorp.com *Email: ladopharcorp@gmail.com



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



Ds. Nguyễn Minh Thắng