


# MẪU NHÃN

## 1. Nhãn ống tiêm 4 ml



## 2. Nhãn hộp 10 ống x 4ml



Đà Nẵng ngày tháng năm 2015

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

DS. Nguyễn Quang Trị, MBA

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

Rx - thuốc bán theo đơn

**DAGLITIN**

**Thành phần:** Cho ống 4 ml

Cholin alfoscerat.....	1 gam
Nước cất pha tiêm vừa đủ.....	4 ml

**Dược lực học**

- Cholin alfoscerat tăng cường quá trình tổng hợp acetylcholin và phospholipids của màng tế bào thần kinh.
- Được sử dụng để phòng ngừa các biến đổi thần kinh, nâng cao khả năng nhận biết và trí nhớ, phục hồi chức năng thần kinh do các tổn thương não có liên quan đến tuổi tác, đột quỵ, bệnh mạch máu mạn tính, sau chấn thương sọ não, tai biến não.

**Dược động học**

- Sau khi tiêm tĩnh mạch chậm, nồng độ cholin huyết tương tăng nhanh sau khoảng 30 phút. Đào thải chủ yếu qua thận dưới dạng carbon dioxid. *ps*
- Cholin alfoscerat dễ dàng vượt qua hàng rào máu não.
- Không gặp các triệu chứng hay thấy các dấu hiệu nhiễm độc ở máu và nước tiểu.
- Không gây đột biến gen và không ảnh hưởng đến thai sản ở động vật.

**Chỉ định**

- Cơ đột quỵ và phục hồi chức năng sau đột quỵ.
- Chấn thương sọ não và phục hồi sau chấn thương và phẫu thuật thần kinh
- Sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, thờ ơ mất định hướng
- Thiếu năng não bộ, hoa mắt, nhức đầu, chóng mặt.
- Giảm hoạt động, vận động, giảm tập trung chú ý, bệnh alzheimer, lú lẫn, giảm trí nhớ ở người già.

**Chống chỉ định**

- Quá mẫn với các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai.

**Liều lượng - Cách dùng:** Tiêm tĩnh mạch chậm 1-2 ống / ngày x 4 tuần.

Có thể kéo dài thời gian dùng theo đáp ứng và theo chỉ dẫn của bác sĩ.

**Thận trọng khi dùng thuốc**

- Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú

**Tương tác thuốc:** Chưa có thông tin

**Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú**

- Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.
- Thận trọng khi dùng thuốc ở phụ nữ đang cho con bú. Nên ngưng cho con bú khi đang dùng thuốc

**Sử dụng ở người đang lái xe và vận hành máy móc**

Không nên sử dụng ở người đang lái xe và vận hành máy móc.

**Tác dụng không mong muốn**





Nếu xảy ra đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, buồn nôn cần giảm liều dùng.

**Thông báo ngay cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc**

**Quá liều:** Không thấy độc tính khi dùng quá liều hoặc điều trị quá dài

**Khuyến cáo**

- Không được dùng thuốc quá hạn có ghi trên bao bì, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng như tủa, vật lạ, cạnh bản xơ bông....

- *Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.*

**Trình bày và bảo quản**

- Thuốc đóng trong ống thủy tinh 4 ml. Hộp 10 ống, có kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng. *RS*

- Để thuốc nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

**- ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM**

- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

*Thuốc được sản xuất tại*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - TP Đà Nẵng

Tel: 0511.3760130

Fax: 0511.3760127

Email: info@danapha.com

Điện thoại tư vấn : 0511.3760131

*Và phân phối trên toàn quốc*

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11 năm 2015



TUQ.CỤC TRƯỞNG  
P.TRƯỞNG PHÒNG  
*Đỗ Minh Hùng*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*ĐS. Nguyễn Quang Trị, MBA*

