

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 15-11-2016

<https://trungtamthuoc.com/>

881/1256

THÀNH PHẦN (Cho 1 gói x 4g):

- Bột Bạch trạch.....0,65g	- Bột Mộc hương.....0,35g	- Bột Trần bì.....0,25g
- Bột Hoàng liên.....0,54g	- Bột Bạch linh.....0,35g	- Cao đặc Cam thảo.....0,04g (tương đương với 0,4g dược liệu)
- Bột Hoài sơn.....0,42g	- Bột Sa nhân.....0,35g	- Cao đặc Đảng sâm.....0,22g (tương đương với 733mg dược liệu)
- Bột Hoàng đằng.....0,40g	- Bột Bạch thược.....0,35g	- Mật ong vừa đủ.....4g

PHÚC HƯNG
SDK
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

PHÚC HƯNG

HỘP 10 GÓI x 4g HOÀN CỨNG

ĐẠI TRÀNG HOÀN-P/H

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM



CHỈ ĐỊNH:
Chữa chứng đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, kiết lỵ, viêm đại tràng cấp và mạn tính.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:
- Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 gói, uống sau bữa ăn.
- Đợt điều trị: 4 - 6 tuần.

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

TIÊU CHUẨN: TCCS

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

PHÚC HƯNG

HỘP 10 GÓI x 4g HOÀN CỨNG

ĐẠI TRÀNG HOÀN-P/H

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

PHÚC HƯNG

<p>CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG</p> <h2>ĐẠI TRÀNG HOÀN-P/H</h2> <p>Gói 4g hoàn cứng</p> <p>ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG SDK: _____</p>	<p>CHỈ ĐỊNH: Chữa chứng đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, kiết lỵ, viêm đại tràng cấp và mạn tính.</p> <p>CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 gói, uống sau bữa ăn. - Đợt điều trị: 4 - 6 tuần.</p> <p>CHỐNG CHỈ ĐỊNH Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.</p> <p>BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C</p> <p>TIÊU CHUẨN: TCCS</p> <p>Số lô SX : Ngày SX : HD :</p>
---	--

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

ĐẠI TRÀNG HOÀN P/H

Thành phần: (cho 1 gói x 4g)

Bột Bạch truat (<i>Pulveres rhizomae atractylodis macrocephalae</i>)	: 0,65g
Bột Hoàng liên (<i>Pulveres rhizomae coptidis</i>)	: 0,54g
Bột Hoài sơn (<i>Pulveres tuberis Dioscoreae persimilis</i>)	: 0,42g
Bột Hoàng đằng (<i>Pulveres caulididis et Radix fibraureae</i>)	: 0,40g
Bột Mộc hương (<i>Pulveres radices saussureae lappae</i>)	: 0,35g
Bột Bạch linh (<i>Pulveres poriae</i>)	: 0,35g
Bột Sa nhân (<i>Pulveres fructi amomi</i>)	: 0,35g
Bột Bạch thược (<i>Pulveres radices paeoniae lactiflorae</i>)	: 0,35g
Bột Trần bì (<i>Pulveres pericarpium citri reticulatae</i>)	: 0,25g
Cao đặc Cam thảo (<i>Extractum radices glycyrrhizae</i>)	: 0,04g
(tương đương với 0,4g dược liệu)	
Cao đặc Đảng sâm (<i>Extractum radices codonopsis pilosulae</i>)	: 0,22g
(tương đương với 733mg dược liệu)	
Mật ong (<i>Mel</i>)	: vừa đủ 4g



Dạng bào chế: Hoàn cứng.

Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 4g hoàn cứng.

Chỉ định: Chữa chứng đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, kiết lỵ, viêm đại tràng cấp và mạn tính.

Cách dùng & liều dùng:

- Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 gói, uống sau bữa ăn.
- Đợt điều trị: 4 - 6 tuần.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao, phụ nữ có thai.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Phụ nữ cho con bú: Thuốc chống chỉ định cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi nên cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú để đảm bảo an toàn cho trẻ bú mẹ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Trong thời gian sử dụng thuốc, không nên uống rượu, bia hay ăn các đồ ăn sống, lạnh, ôi, thiu.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024