

# ĐẠI TRÀNG HOÀN P/H

Thành phần: (cho 1 viên)

Cao đặc Bạch truật (Extractum rhizomea atractylodis macrocephalae)	: 30mg
(tương đương với 85mg dược liệu)	
Cao đặc Đẳng sâm (Extractum radicis codonopsis pilosulae)	: 30mg
(tương đương với 100mg dược liệu)	
Bột Mộc hương (Pulveres radix saussureae lappae)	: 30mg
Bột Hoài sơn (Pulveres tuberis dioscoreae persimilis)	: 25mg
Bột Bạch thược (Pulveres radicis paeoniae lactiflorae)	: 22mg
Bột Bạch linh (Pulveres paniae)	: 20mg
Bột Ý dĩ (Pulveres semensis coicis)	: 20mg
Bột Sa nhân (Pulveres fructi aromae)	: 20mg
Bột Hoàng liên (Pulveres rhizomae coptidis)	: 20mg
Bột Trần bì (Pulveres pericarpii citri reticulatae)	: 15mg
Bột Cát cánh (Pulveres radix platycodi grandiflori)	: 10mg
Bột Sơn tra (Pulveres fructi malii)	: 5mg
Tá dược (croscarmellose sodium, than hoạt tính, sáp ong trắng, nước tinh khiết)	vừa đủ 1 viên

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 240 viên.

Chỉ định: Chữa chứng đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, kiết lỵ, viêm đại tràng cấp và mạn tính.

Cách dùng & liều dùng:

- Ngày uống 3 lần, mỗi lần 18 - 22 viên, uống sau bữa ăn.
- Đợt điều trị: 4 - 6 tuần.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thuốc chống chỉ định cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi nên cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú để đảm bảo an toàn cho thai nhi và cho trẻ bú mẹ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Trong thời gian sử dụng thuốc, không nên uống rượu, bia hay ăn các đồ ăn sống, lạnh, ôi, thiu.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

**Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Việt Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: [www.dongduocphuchung.com.vn](http://www.dongduocphuchung.com.vn)

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024

<https://trungtamthuoc.com/>