

℞ Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc



DECOLIC

Trimebutin 24mg

BỘT PHA HỖN DỊCH UỐNG - Gói 1,15g

CÔNG THỨC: Cho 1 gói 1,15g

- Trimebutin maleat tương ứng với Trimebutin..... 24 mg
- Tá dược: Natri carboxymethyl cellulose, Natri citrat, Cremophor RH40, Màu sunset yellow, Bột hương vị cam, Đường trắng.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

DƯỢC LỰC HỌC:

Thuốc chống co thắt có tác dụng trên cơ. Điều chỉnh sự vận động đường tiêu hóa. Là một chất chủ vận enképhalinerigique ở ngoại biên. Trimebutin có thể kích thích sự vận động ở ruột và cũng có thể ức chế sự vận động này nếu trước đó đã bị kích thích.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Thuốc đạt nồng độ tối đa trong máu sau khi uống từ 1 – 2 giờ.
- Thuốc được đào thải nhanh, chủ yếu qua nước tiểu, trung bình 70% sau 24 giờ.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị triệu chứng đau do rối loạn chức năng của ống tiêu hóa và đường mật.
- Điều trị hội chứng ruột kích thích, rối loạn chức năng tiêu hóa, co thắt đau quặn bụng, đầy hơi, tiêu chảy hoặc táo bón.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai 3 tháng đầu.

THẬN TRỌNG:

Đối với bệnh nhân bị tiểu đường cần lưu ý lượng đường saccarose có trong thuốc. Phụ nữ có thai chỉ sử dụng thuốc khi thật sự cần thiết.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có tài liệu báo cáo về tương tác của thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Các nghiên cứu lâm sàng đã ghi nhận rất hiếm khi xảy ra các phản ứng ở da.

Thông báo cho bác sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không sử dụng cho phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu thai kỳ và thận trọng trong suốt thai kỳ.

Phụ nữ cho con bú không ảnh hưởng.

LÁIXE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có thông tin.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:

Khuấy 1 gói bột thuốc với 5 ml (1 muỗng cà phê) nước trước khi uống. Liều thông thường:

- Người lớn: 3 gói/lần, ngày 3 lần.
- Trẻ em từ 5 tuổi trở lên: 2 gói/lần, ngày 3 lần.
- Trẻ em dưới 5 tuổi: 4,8mg/kg thể trọng/ngày (mỗi 5 kg thể trọng uống 1 gói thuốc) chia làm 3 lần.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 20 gói x 1,15g bột pha hỗn dịch uống.

BẢO QUẢN:

Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

- Bột pha hỗn dịch uống DECOLIC đạt theo TCCS.
- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Sản xuất tại: Nhà máy GMP - WHO số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. HCM



F.T. PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

601 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10, TP. HCM

TEL: 39770965 - 39770966 - 39770967 - 37422612. FAX: 39770968

Email: duocpham32@ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com