

Kem thoa da giảm đau

M E N T H O L A T U M

DEEP HEAT

Rub Plus



XIN ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG VÀ GIỮ ĐƠN NÀY ĐỂ TRA CỨU KHI CẦN.

Thoa kem lên chỗ đau và xoa bóp kỹ. Những hoạt chất của thuốc thấm sâu vào da làm giảm cơn đau. Kem Deep Heat Rub Plus sẽ gây nóng vùng được xoa.

❖ **Những người có triệu chứng sau đây nên dùng kem thoa da giảm đau:**



Đau và mỏi cơ sau các hoạt động thể dục thể thao, hoặc ở người già.



Đau lưng hay đau cứng vai trong công việc hoặc việc nhà.



Đau khớp ở khuỷu tay, đầu gối và mắt cá chân.



Đau dây thần kinh hay thấp khớp.

❖ **Thành phần hoạt chất (trong 30 g):**

| | | |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl Salicylate | 3,600 g | Thuộc nhóm giảm đau, kháng viêm không steroid, có tác dụng kháng viêm giống các salicylate khác. Methyl Salicylate cho sức nóng mạnh, làm giãn các mạch gần bề mặt da, nhờ vậy các hoạt chất dễ dàng thấm qua da làm giảm ngay các cơn đau liên quan đến các bệnh thấp khớp, viêm khớp, viêm mô xơ, đau lưng, đau cơ, bong gân. |
| l - Menthol | 1,800 g | Giảm đau qua cơ chế kích thích hệ thần kinh tiếp nhận cảm giác lạnh và ức chế hệ thần kinh tiếp nhận cảm giác đau. |
| Eucalyptus oil | 0,600 g | Phổ kháng khuẩn rộng, kháng viêm và giảm đau. |
| Turpentine oil | 0,450 g | Gia tăng sự thẩm thấu thuốc qua da, kháng viêm, giảm đau, điều trị các bệnh thấp khớp. |

Tá dược: Lavender oil, Self-emulsifying Glyceryl Monostearate, Sodium Cetylsulfate, Light Liquid Paraffin, Polyoxyethylene Arachyl Ether - Stearyl Alcohol Mixture, nước tinh khiết.

- ❖ **Dạng bào chế:** Kem thoa da.
- ❖ **Quy cách đóng gói:** Hộp 1 tuýp 30 g.
- ❖ **Chỉ định:** Đau cơ, đau lưng, đau khớp, cứng vai, mỏi cơ, đau dây thần kinh, vết bầm, bong gân, cứng cơ, thấp khớp.
- ❖ **Liều dùng & Cách dùng:** Thoa lượng kem vừa đủ lên chỗ đau nhiều lần trong ngày.
- ❖ **Chống chỉ định:** Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc. Da bị chàm, nhiễm độc hay vết thương. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Thận trọng khi dùng thuốc:

1. Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trong những trường hợp sau đây:

- (1) Có tiền căn dị ứng với thuốc hay mỹ phẩm (vd: nổi mụn, rộp mẩn da, ngứa, nhiễm độc da).
- (2) Đang trong quá trình trị liệu.




2. Lưu ý trước khi dùng:

- (1) Không thoa quá liều.
- (2) Đối với trẻ em, chỉ sử dụng dưới sự giám sát của người lớn.
- (3) Tránh thoa lên mắt. Nếu xảy ra tình trạng trên, rửa kỹ với nước hay nước ấm. Nếu tình trạng trở nặng, đi khám bác sĩ nhãn khoa ngay.
- (4) Thuốc chỉ sử dụng ngoài da. Không được uống.



3. Lưu ý trong và sau khi sử dụng:

Nếu sử dụng thuốc này mà bị nổi mụn, ngứa khó chịu (đau, nóng rát), rộp mẩn da hay tróc da như trong trường hợp ghê... ngưng dùng và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.



4. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Chưa có bất kỳ trường hợp ảnh hưởng nào tới phụ nữ có thai và cho con bú cũng như thai nhi.

5. Ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Không có ảnh hưởng.

❑ **Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác:** Không có tương tác thuốc. Tuy nhiên, không bôi cùng lượt nhiều loại thuốc dùng ngoài da.

❑ **Tác dụng không mong muốn:** Có thể gây ra dị ứng ở những cơ địa có da dễ bị kích ứng. Ngưng dùng thuốc và thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

❑ **Quá liều và cách xử trí:** Khi dùng quá liều có thể gây nóng rát và kích ứng vùng da thoa thuốc. Nếu xảy ra, ngưng sử dụng thuốc và xin ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

❑ **Bảo quản:**

1. Đậy nắp tuýp thuốc sau khi sử dụng và bảo quản nơi khô mát (dưới 30 °C), tránh ánh nắng trực tiếp.
2. Để tránh sử dụng nhầm lẫn và bảo quản chất lượng, không chuyển thuốc này qua một vật đựng khác.

❑ **Hạn sử dụng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thuốc dùng ngoài.

Để xa tầm tay trẻ em.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng (xem trên bao bì).

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến bác sĩ.

SĐK: VD-24034-15

Bộ phận hỗ trợ khách hàng

(028) 3822 9322

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00
(trừ ngày lễ, thứ bảy, Chủ Nhật)

ROHTO

www.rohto.com.vn

Sản xuất bởi:

CTY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore,
phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

ĐT liên lạc: 028-38229322

Trụ sở chính:

ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
OSAKA, JAPAN