

Tờ Hướng dẫn sử dụng

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
HỎI THẦY THUỐC ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

DIOXZYE

Viên nhai – Hương bạc hà

Thành phần:

Hoạt chất: Mỗi viên DIOXZYE (Hương bạc hà) chứa:

Simethicone : 80,0 mg

Tá dược: Natri cyclamate, Menthol, dầu bạc hà, Calci stearate, Sorbitol, Povidone K-30.

Chỉ định:

DIOXZYE được dùng như một chất chống đầy hơi làm giảm các triệu chứng thông thường do đầy hơi, bao gồm cảm giác bị ép và căng đầy ở vùng thượng vị, bằng cách làm giảm sức căng bề mặt từ đó làm xẹp các bóng khí và loại bỏ chúng dễ dàng bằng phản ứng ợ hoặc qua hơi ruột.

Liều lượng và cách dùng:

1-2 viên mỗi lần, ngày dùng 4 lần sau bữa ăn và trước khi đi ngủ. Nhai kỹ trước khi nuốt.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với Simethicone.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Simethicone dường như không được hấp thu qua đường tiêu hóa hay làm cản trở tiết dịch vị hay sự hấp thu các chất bổ dưỡng, bởi vậy không gây nên các tác dụng không mong muốn toàn thân.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Cảnh báo, thận trọng:

Simethicone thuộc nhóm thuốc không độc tính. Simethicone được khuyến cáo không nên dùng cho các trường hợp đau bụng ở trẻ sơ sinh do chưa có đầy đủ thông tin về tính an toàn của simethicone ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không có thông tin.

Tương tác với các thuốc khác:

Không có thông tin

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Không có thông tin.

Đóng gói: Vi nhâm chứa 10 viên. Hộp chứa 25 vi, 50 vi.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

Nhà sản xuất



CTy TNHH THAI NAKORN PATANA (Việt Nam)

636 Nguyễn Tất Thành - P. 9 - TP. Tuy Hòa - Phú Yên - Việt Nam

Nhà nhượng quyền:



CTy TNHH THAI NAKORN PATANA (Thái Lan)

94/7 Soi Ngamwongwan 8 (Yimprakorb) -Ngamwongwan-Nonthaburi-Thailand