

# DOPOLYS®

## THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa

- Ginkgo biloba extract ..... 7 mg
- Heptaminol hydrochlorid ..... 150 mg
- Troxerutin ..... 150 mg
- Tá dược: Avicel, Povidon, Sodium starch glycolat, Aerosil, Magnesi stearat ...  
vừa đủ 1 viên nang

## DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang.

## QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 3 vỉ x 10 viên nang.
- Chai 100 viên nang.

## DƯỢC LỰC HỌC:

Trợ tĩnh mạch và bảo vệ mạch máu (tăng trương lực tĩnh mạch và sức bền của mạch máu và giảm tính thấm) kèm theo tính ức chế tại chỗ đối với vài hóa chất trung gian gây đau (histamin, bradykinin, serotonin), men tiêu thể và gốc tự do gây viêm và thoái hóa sợi collagen.

**DƯỢC ĐỘNG HỌC:** Do các hoạt chất chính được phối hợp nên không nghiên cứu dược động học trên người.

## CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị triệu chứng suy tĩnh mạch bạch huyết: Nặng chân, vộp bẻ, đau nhức, hội chứng căng chân rung khi nằm.
- Điều trị những dấu hiệu chức năng có liên quan đến cơn trĩ cấp.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Bệnh cường giáp.
- Phối hợp với IMAO.
- Cao huyết áp nặng.



DOMESCO

## NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 067. 3851950

## THẬN TRỌNG:

- Theo dõi huyết áp khi bắt đầu điều trị ở bệnh nhân cao huyết áp nặng.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Không phối hợp với IMAO: nguy cơ gây cao huyết áp do có Heptaminol.

## SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Thí nghiệm trên động vật cho thấy không có tác dụng gây quái thai. Ở người, nghiên cứu trên phụ nữ có thai 3 tháng đầu còn chưa đầy đủ, do đó nguy cơ dùng thuốc chưa được kết luận. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn không ghi nhận trường hợp nào trẻ bị dị dạng do mẹ dùng thuốc trong 3 tháng đầu mang thai.

- Phụ nữ cho con bú: Chưa xác định được thuốc có được tiết vào sữa hay không do đó không nên dùng trong giai đoạn cho con bú.

\* Thuốc không ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc.

## TÁC DỤNG PHỤ:

- Heptaminol có thể gây kích thích tim, tăng huyết áp.

- Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

## CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG: Dùng uống

- Suy tĩnh mạch bạch huyết: 2 viên x 2 lần/ngày, trong các bữa ăn.

- Đối với trĩ, điều trị tấn công: 6 – 8 viên/ngày, trong 01 tuần vào các bữa ăn.

## \* Lưu ý:

- Trong cơn trĩ cấp: Việc dùng thuốc này không thay thế được điều trị đặc hiệu cho các bệnh hậu môn khác. Nếu triệu chứng không thuyên giảm nhanh chóng, nên thực hiện khám trĩ và xem xét lại cách điều trị.

**QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:** Trường hợp lạm dụng thuốc quá độ (20 viên/lần/50kg) cần theo dõi huyết áp và nhịp tim tại bệnh viện.

## KHUYẾN CÁO:

- **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**, nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của Bác sĩ.

- **Đẻ xa tầm tay trẻ em.**

**BẢO QUẢN:** Ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** Tiêu chuẩn cơ sở.