



**Hướng dẫn sử dụng thuốc**  
**DOTASEA oral**



- **Dạng thuốc:** Cao lỏng
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 30 ống x 10ml.
- **Thành phần:** Mỗi 10ml cao lỏng chứa:

Cao lỏng Lục vị	0,5g
Tương ứng với các dược liệu	
Thục địa ( <i>Radix Rehmanniae praeparata</i> )	1,6g
Hoài sơn ( <i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i> )	0,8g
Sơn thù ( <i>Fructus Corni</i> )	0,8g
Đan bì ( <i>Cortex Moutan</i> )	0,6g
Bạch linh ( <i>Poria Cocos</i> )	0,6g
Trạch tả ( <i>Rhizoma Alismatis</i> )	0,6g
Tá dược vừa đủ	10 ml

(Tá dược gồm: Nipagin, nipasol, acid citric, natri citrat, aspartam, ethanol 96%, nước tinh khiết).

- **Công năng:** Tư bổ can thận. Các vị trong bài thuốc có tác dụng: **Thục địa** tư âm bổ Thận, dưỡng tinh ích tủy là **Quân**. **Sơn thù** dưỡng Can sáp tinh, **Hoài sơn** bổ Tỳ cố tinh là **Thần**. **Trạch tả** thanh tả Thận hòa, giảm bớt tính nề trệ của Thục địa; **Đan bì** thanh Can hòa, giảm bớt tính ôn của Sơn thù; **Bạch linh** kiện Tỳ, trừ thấp giúp Hoài sơn kiện Tỳ cùng là **Tá**

- **Chỉ định:**

- + Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, ốm yếu, gầy còm, người nóng.
- + Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, háo khát, tiểu rất, ra mồ hôi trộm.

- **Liều dùng:**

- + Trẻ em: Ngày uống 10ml
- + Người lớn: Ngày uống 20-30ml, mỗi lần 10ml
- Hay theo chỉ dẫn của thầy thuốc
- Có thể pha loãng với nước để uống cho thích hợp.

- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với thuốc, người tỳ vị hư hàn, ỉa chảy. Người bị mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai:** không dùng cho phụ nữ có thai.

- **Sử dụng phụ nữ cho con bú:** dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn thật cụ thể của thầy thuốc.

- **Tác dụng của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:** Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có tài liệu báo cáo.

\* **Ghi chú:** " Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Kiêng ăn các thứ sống, cay nóng khi đang dùng thuốc.

- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**

\* **Lưu ý:** Chế phẩm sử dụng chất tạo ngọt aspartam nên sử dụng được cho bệnh nhân tiểu đường. Khi thấy thuốc bị vẩn đục, chuyển mùi, số lô SX, HD mờ... hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS



**ĐỀ XA TÀM TAY TRẺ EM**

"*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sỹ*"

**THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

*Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội*

*Số điện thoại: 04.33824685 Số fax: 04.33829054*

**CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*ĐS. Nguyễn Bá Lai*



TU. CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
*Lê Minh Hùng*

