



* Nổi lên trên hộp 6 vỉ x 5 viên: (Bổ sung lần 1)

TrungTamThuoc.com



DHG PHARMA

Hộp 6 vỉ x 5 viên nang mềm

L-CYSTEINE



GMP-WHO

EDIVA
L-CYSTEINE
L-cystine 500 mg

THÀNH PHẦN:
L-cystine 500 mg
Tà được vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:
Các bệnh biểu bì làm mỏng, tóc khô giòn, dễ gãy.
Hỗ trợ trong các trường hợp viêm da do thuốc, sạm da, sần nhằng, sạm nắng, eczema, mụn trứng cá.

CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Người lớn: 2 - 4 viên/ ngày, có thể dùng liên tục trong thời gian 10 - 20 ngày mỗi tháng. Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Người suy thận, suy gan nặng.

EDIVA
L-CYSTEINE
L-cystine 500 mg

GMP-WHO

L-CYSTEINE

L-cystine
500 mg



Box of 6 blisters x 5 soft capsules

DHG PHARMA



8 935206 093124

0710.3895209

Sản xuất bởi: DHG PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
78 Bè, Ngã tư Lộ 7, An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3891433 • Fax: (0710) 3895209
www.dhgpharma.com.vn

ĐỂ XÀ TẮM SẠY TRÈ EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG.
TRUY KIỂM BẢO QUẢN ƯỚC KHÔ,
NHỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C, TRÁNH ẨM SÁNG.

SĐK (Reg. No.):

Ngày SX (Mfg date):

Số M SX (Batch No.):

HĐ (Exp date):

Size 90%

48/151



Nhãn trên vỉ 5 viên:

TrungTamThuoc.com

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 09/09/2015

EDIVA
L-CYSTINE
L-cystine 500 mg

EDIVA
L-CYSTINE
L-cystine 500 mg

EDIVA
L-CYSTINE
L-cystine 500 mg

EDIVA
L-CYSTINE
L-cystine 500 mg

CTCP DƯỢC HẬU GIANG

DHG PHARMA

Số 10 ĐC: HỒ:

Số 10 ĐC:





TrungTamThuoc.com

Chỉ dẫn sử dụng thuốc: (Bổ sung lần 1)



EDINA

L-CYSTINE

L-cystine 500 mg

CÔNG THỨC:
L-cystine 500 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên
(Đầu co, lecithin, dầu nành tinh luyện, gelatin, sorbitol lỏng, glycerin, kali sorbat, vanilin, oxyd sắt đỏ, oxyd sắt đen, màu ponceau).

DẠNG BAO CHẾ: Viên nang mềm.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 6 vỉ x 5 viên.

TÍNH CHẤT: L-cystine là một amino acid tự nhiên có trong nhung hươu, chứa gốc -SH nên có tác dụng khử các gốc tự do là tác nhân đóng vai trò chủ yếu trong nhiều bệnh thoái hóa và lão hóa da.

L-cystine hấp thu tốt từ đường ruột, nồng độ đỉnh huyết tương đạt từ 1 đến 6 giờ sau khi uống, được phân bố chủ yếu ở gan và chuyển hóa qua gan như taurin và acid pyruvic, thải trừ chủ yếu qua mật.

L-cystine có tác dụng tăng chuyển hóa da, đưa hắc tố ra lớp da phía ngoài và đào thải cùng với lớp sừng, nhanh chóng tái tạo lớp da mới. L-cystine còn có tác dụng điều hòa bài tiết chất nhờn, một nguyên nhân khiến da dễ nổi mụn, dị ứng trước tác động của môi trường và sinh hoạt hằng ngày. L-cystine còn tăng cường tạo keratin, làm vững chân tóc, cứng móng.

CHỈ ĐỊNH: Các bệnh biểu bì làm móng, tóc khô giòn, dễ gãy.

Hỗ trợ trong các trường hợp viêm da do thuốc, sạm da, tàn nhang, sạm nắng, eczema, mụn trứng cá.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người suy thận, suy gan nặng.

THẬN TRỌNG: Không nên dùng cho bệnh nhân bị chứng cystein niệu.

Trẻ em dưới 6 tuổi.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Chưa tìm thấy tài liệu.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa tìm thấy tài liệu.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa tìm thấy tài liệu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Vài trường hợp có thể gặp tăng mụn trứng cá nhẹ ở giai đoạn đầu dùng thuốc, đây là tác dụng loại bỏ chất cặn bã ở da của thuốc và sẽ hết khi tiếp tục điều trị.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Chưa tìm thấy tài liệu.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn: 2 - 4 viên/ ngày. Có thể dùng liên tục trong thời gian 10 - 20 ngày mỗi tháng.

Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Sản xuất bởi: DHG PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 • Fax: (0710) 3895209

Mọi chi tiết xin liên hệ:
☎ 0710.3899000
E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
www.dhgpharma.com.vn



TUO CUC TRUONG
P. TRUONG PHONG
Nguyễn Thị Thu Thủy

