

XIN ĐỌC KỸ TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI DÙNG THUỐC
ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HAY DƯỢC SĨ

Eludril

Thuốc súc miệng

1. TÊN THUỐC

Tên biệt dược: ELUDRIL, thuốc súc miệng

THÀNH PHẦN

Hoạt chất: Chlorhexidin digluconat 0,1g và chlorobutanol hemihydrat 0,5g.

Tá dược: Ethanol 96%, levomenthol, glycerol, natri docusat, tinh dầu bạc hà, màu đỏ cochenil A, nước tinh khiết vừa đủ 100ml.

Dung dịch có độ cồn 42,8%.

Dạng bào chế: Thuốc súc miệng.

2. CHỈ ĐỊNH

Điều trị phụ trợ tại chỗ các chứng nhiễm khuẩn miệng và chăm sóc hậu phẫu răng - miệng.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng với chlorhexidin, chlorobutanol hoặc các thành phần khác của thuốc.

Thận trọng khi dùng

Tránh để thuốc chảy vào mắt và mũi. Không nên nhỏ thuốc vào lỗ tai.

Nếu các triệu chứng không giảm sau 5 ngày và/hoặc người bệnh đồng thời bị sốt, cần đánh giá lại phương pháp trị liệu.

Sử dụng thuốc lâu dài có thể làm răng, răng giả bị đổi màu. Sự đổi màu chỉ thoáng qua và sẽ mất đi khi ngưng thuốc.

Có thai và cho con bú: Khi có thai hoặc đang cho con bú nên hỏi ý kiến của bác sĩ hay dược sĩ trước khi dùng thuốc.

4. CÁCH DÙNG

Liều lượng:

Dùng cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi:

Súc miệng 2 đến 3 lần mỗi ngày.

Đổ thuốc vào cốc định mức tới vạch 10ml, 15ml hay 20ml, xong cho nước ấm vào tới vạch trên cùng rồi súc miệng cho đến hết cốc.

Trước khi sử dụng phải đánh răng và súc miệng thật kỹ.

Thời gian điều trị có thể kéo dài đến 2 tuần trong trường hợp viêm lợi và viêm nha chu. Việc kéo dài trị liệu trên 2 tuần phải có chỉ định của bác sĩ.

Đường dùng và cách dùng: Dùng súc miệng. Không được uống.

Nếu quên sử dụng thuốc 1 lần: Không nên dùng liều gấp đôi để bù vào.

5. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

- Có thể có các phản ứng mẫn cảm của da đối với chlorhexidin, tuy nhiên phản ứng mẫn cảm nghiêm trọng như sốc phản vệ hiếm khi xảy ra sau khi dùng chlorhexidin ngoài da.

- Thuốc có thể có vị khó chịu thoáng qua hoặc gây cảm giác rát lưỡi khi mới sử dụng.

- Thuốc có thể làm biến màu lưỡi, răng, mảng trám răng bằng silicat hoặc composite.

- Có thể gặp tróc vảy da trong miệng hoặc đôi khi sưng tuyến mang tai. Trong trường hợp này cần pha loãng thuốc với nước và súc miệng nhẹ nhàng hơn.

KHI GẶP BẤT CỨ PHẢN ỨNG PHỤ NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÊU TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC, XIN VUI LÒNG THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ CỦA QUÝ VỊ.

6. TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

Tránh dùng các thuốc sát trùng khác đồng thời hoặc ngay sau khi dùng Eludril vì có thể xảy ra tương tác thuốc (đối kháng, khử hoạt...).

Kem đánh răng có thể chứa chất điện hoạt anionic như sodium laurilsulfat, chất này tương kỵ với



01

chlorhexidin có trong dung dịch Eludril. Do đó, cần đánh răng ít nhất 30 phút trước khi dùng thuốc súc miệng Eludril.

NÊN THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ HAY DƯỢC SĨ CỦA BẠN BẤT KỲ THUỐC ĐIỀU TRỊ NÀO KHÁC HIỆN ĐANG SỬ DỤNG.

7. QUÁ LIỀU

Nguy cơ quá liều không xảy ra nếu chế phẩm được sử dụng làm thuốc súc miệng. Tuy nhiên, nếu lỡ uống có thể xảy ra nhiễm độc thần kinh. Trong trường hợp này phải điều trị theo chuyên khoa.

8. BẢO QUẢN

Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không nên dùng thuốc quá thời hạn được ghi trên bao bì.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Quy cách: Hộp 1 chai 90ml.

Tên và địa chỉ công ty sản xuất:

CÔNG TY TNHH PIERRE FABRE VIỆT NAM

Số 1, đường 4A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai

ĐT: 061 383 6770

Fax: 061 383 6570



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh