

Enterogolds

BẢO TỬ VỊ KHUẨN KHÁNG BÀ KHÁNG SINH BACILLUS CLAUSII

VIÊN NANG CỨNG 500mg

THÀNH PHẦN: Trong 1 viên nang 500mg chứa:
- Bacillus clausii: 2 x 10¹⁰ CFU
- Tá dược (Lactose, Magnesi stearat, Glucose)... đủ 500mg

DẠNG BẢO CHẾ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Viên nang cứng.
- Hộp 6 vỉ x 10 viên.
- Hộp 1 lọ x 60 viên.
- Lọ 100 viên.

DƯỢC LỰC HỌC:

- ▶ Bacillus clausii tồn tại trong sinh phẩm ở trạng thái bào tử, nhờ vậy khi uống vào dạ dày nó không bị axit cũng như các enzym tiêu hóa ở dịch vị phá hủy. Bào tử Bacillus clausii cũng có thể sống sót dưới sự tấn công của muối mật trong ruột non. Nhờ những đặc tính này, Bacillus clausii dễ dàng đến ruột non để phát triển thành dạng sinh dưỡng, giúp tái lập cân bằng hệ vi sinh đường ruột.
- ▶ Bacillus clausii có khả năng tổng hợp một số vitamin, đặc biệt vitamin nhóm B, góp phần bổ sung vitamin thiếu hụt do việc dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- ▶ Bacillus clausii kích thích chức năng của hệ miễn dịch đường tiêu hóa bằng cách tăng sản xuất của tiết A immunoglobulin - gián tiếp hoạt động như một chốt dõ kháng và vi khuẩn gây bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hóa.
- ▶ Bacillus clausii có khả năng phát triển và hoạt động ngay khi có mặt các kháng sinh như penicillins, cephalosporins, tetracyclines, macrolides, aminoglycosides, novobiocin, chloramphenicol, lincosylin, rifampicin, nalidixic acid...

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Bacillus clausii xuất hiện trong phân và đạt đến nồng độ tối đa sau chỉ 1 ngày điều trị. Nồng độ Bacillus clausii đã đạt được duy trì gần như không đổi trong suốt thời gian điều trị, sau đó giảm xuống theo cấp lũy thừa trong thời gian theo dõi (50% của nồng độ tối đa vào ngày thứ 3-4, trở về nồng độ lúc ban đầu nghiên cứu vào khoảng ngày thứ 10).

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kèm hấp thu vitamin nội sinh.
- Điều trị hỗ trợ để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Uống mỗi lần 1 viên, 1 - 2 viên/ ngày.
- Người lớn: Uống mỗi lần 1 viên, 3 - 4 viên/ ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Thận trọng khi dùng trong thời gian điều trị và thuốc kháng sinh, nên uống Enterogolds xen kẽ giữa các liều dùng kháng sinh.
- Khi dùng cho trẻ em, thuốc có thể vào đường hô hấp gây suy

- hồ hấp, từ vùng vi thuốc dạng viên nang cứng.
- Phụ nữ có thai và cho con bú: không ảnh hưởng.
- Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: không ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Không có tương tác thuốc khi dùng chung với các thuốc khác.
- Để ngăn ngừa tương tác thuốc có thể có với một vài loại thuốc, hãy thông báo cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ biết nếu đang sử dụng bất kỳ thuốc gì.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUẢ LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Chưa có báo cáo về việc sử dụng quá liều.
- Nếu dùng quá liều thuốc khuyến cáo, bỏ quá liều tiếp theo, sau đó tiếp tục liều trình như thông thường.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Đề xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.**



Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHÀ TRANG
Văn phòng: 26 Hàn Thuyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Nhà máy: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa



BEPHARCO

Phân phối bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRÉ.**
Văn phòng: 436B/76, đường 3 tháng 2, P.12, Q.10, TP. HCM
Tel: (+84)06220205 / Fax: (+84)0632115
Email: bepharco.vietnam@bepharco.com

Hotline: **18001745**

