



Enterogolds

BÀU TỬ VI KHUẨN KHÁNG ĐA KHÁNG SINH **BACILLUS CLAUSII**

THÀNH PHẦN: Trong 1 viên nang 500mg chứa:

- *Bacillus clausii*: 2×10^9 CFU
- Tá dược (Lactose, Magnesi stearat, Glucose)...vừa đủ 500mg

DẠNG BÀO CHẾ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Viên nang cứng.
- Hộp 6 vỉ x 10 viên.
- Hộp 1 lọ x 60 viên.
- Lọ 100 viên.

ĐƯỢC LỰC HỌC:

- *Bacillus clausii* tồn tại trong sinh phẩm ở trạng thái bào tử, nhờ vậy khi uống vào dạ dày nó không bị axit cũng như các enzym tiêu hóa ở dịch vị phâ huy. Bào tử *Bacillus clausii* cũng có thể sống sót dưới sự tấn công của muối mêt trong ruột non. Nhờ những đặc tính này, *Bacillus clausii* dễ dàng đến ruột non để phát triển thành dạng sinh dưỡng, giúp tái lập cân bằng hệ vi sinh đường ruột.
- *Bacillus clausii* có khả năng tổng hợp một số vitamin, đặc biệt vitamin nhóm B, góp phần bổ sung vitamin thiếu hụt do việc dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- *Bacillus clausii* kích thích chức năng của hệ miễn dịch đường tiêu hóa bằng cách tăng sản xuất của tiết A immunoglobulin - gián tiếp hoạt động như một chất đối kháng với vi khuẩn gây bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hóa.
- *Bacillus clausii* có khả năng phát triển và hoạt động ngay khi có mặt các kháng sinh như penicillins, cephalosporins, tetracyclines, macrolides, aminoglycosides, novobiocin, chloramphenicol, lincomycin, rifampicin, nalidixic acid...

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC:

Bacillus clausii xuất hiện trong phân và đạt đến nồng độ tối đa sau chỉ 1 ngày điều trị. Nồng độ *Bacillus clausii* đã đạt được duy trì gần như không đổi trong suốt thời gian điều trị, sau đó giảm xuống theo cấp lũy thừa trong thời gian theo dõi (50% của nồng độ tối đa vào ngày thứ 3-4, trở về nồng độ lúc ban đầu nghiên cứu vào khoảng ngày thứ 10).

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Điều trị hỗ trợ để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Rối loạn tiêu hóa cấp và mãn tính.


LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Trẻ em từ 6 tuổi trở lên: Uống mỗi lần 1 viên, 1-2 viên/ngày.
- Người lớn: Uống mỗi lần 1 viên, 3-4 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬM TRỌNG:

- Thận trọng khi dùng trong thời gian điều trị với thuốc kháng sinh, nên uống Enterogolds xen kẽ giữa các liều dùng kháng sinh.
- Khi dùng cho trẻ em, thuốc có thể vào đường hô hấp gây suy



hô hấp, tử vong vì thuốc dạng viên nang cứng.

- Phụ nữ có thai và cho con bú: không ảnh hưởng.
- Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: không ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Không có tương tác thuốc khi dùng chung với các thuốc khác.
- Để ngăn ngừa tương tác thuốc có thể có với một vài loại thuốc, hãy thông báo cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ biết nếu đang sử dụng bất kỳ thuốc gì.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gấp phải khi sử dụng thuốc.

QUẢ LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Chưa có báo cáo về việc sử dụng quá liều.
- Nếu dùng quá liều thuốc khuyến cáo, bỏ qua liều tiếp theo, sau đó tiếp tục liều trình như thông thường.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.



Sản xuất bởi

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Văn phòng: 26 Hòn Thuyền, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

Nhà máy: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa.



BEPHARCO

Phân phối bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE.

Văn phòng: 436B/76, đường 3 tháng 2, P.12, Q.10, TP. HCM.

Tel: (+848)36220205 / Fax: (+848)8632115.

Email: bepharco.vietnam@bepharco.com

Website: www.bepharco.com

