



VV 2027L-A7

TN - 32475

0001159



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/09/2017



THÀNH PHẦN: Natri 1 mg/ml chứa:

Docusate sodium 50 mg

CHỈ ĐỊNH:

Dung dịch nhỏ tai Etobat được chỉ định giúp

loai bỏ rãy tai ở người lớn, người già và trẻ em

LIỀU DÙNG:

Nhỏ thuốc đủ để lắp đầy tai cần điều trị 1

tần/volley trong 1 đến 2 buốt tối thiểu nhau

Thông tin chi tiết xem trong tờ hướng dẫn sử dụng

CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG

KHÔNG NƯỚNG, CÁC THÔNG TIN KHÁC

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

BẢO QUẢN:

Không quá 30 °C, tránh ánh sáng trực tiếp

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐIỀU KÝ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SƠU/ Visa No.:

Sản xuất: MERAP GROUP
Merap Group Corporation
Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam
www.merapgroup.com





DUNG DỊCH NHỎ TAI
ETOBAT
DOCUSAT Natri 0,5%

ĐẾ XÁ TẨM TAY TRẺ EM, ĐỌC KÝ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sự những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

THÀNH PHẦN: Mùi 1 lọ chứa:

Docusat natri 0,5%
Tá dược: Polypropylene glycol 400, glycerin, propyl paraben, propyl paraben, acid citric monohydrate, sodium citrate dihydrate, nước tinh khiết

MÔ TẢ DẠNG BAO CHÉP: Dung dịch trong, không màu đóng trong lọ nhựa màu trắng đục, có nút nắp gạt và nắp chụp ngoài

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 lọ 10 ml

Hộp 1 lọ 15 ml

CHỈ ĐỊNH - THUỐC DÙNG CHO BỆNH GIÀI: Dung dịch nhỏ tai Etobat được chỉ định giúp loại bỏ rãy tai ở người lớn, người già và trẻ em

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU DÙNG?

Liều dùng:

Người lớn (bao gồm cả người già) và trẻ em trên 6 tuổi: Nhỏ thuốc dùi lấp đầy cá nhân đều tr 1 lát/ngày trong 1 đến 2 buổi tối kế tiếp nhau. Nếu cảm thấy tình trạng không được cải thiện bệnh nhân nên tham khảo ý kiến bác sĩ

Chỉ sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi khi có tư vấn y tế

Cách dùng:

Thứa gian tốt nhất để sử dụng Etobat là buồi tối trước khi đi ngủ, nghe tiếng đà và nhỏ đầy thuốc vào ống tai, sau đó đặt nút bông gòn vào trong tai. Laoi buốt bông gòn vào buỗi sáng và lặp lại việc điều trị vào đêm tiếp theo

CHỐNG ĐIỀU KÌNH KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY:

Không sử dụng thuốc trong các trường hợp thông mang nhồi hoặc nếu bị đau, viêm

Mẫn cảm với các thành phần của thuốc

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Rối loạn hệ thống miễn dịch: Ởba mẫn phản ứng dị ứng

Rối loạn da: Viêm da tiếp xúc và các phản ứng dị ứng da

Rối loạn đường hô hấp: Phản ứng tại chỗ hemic khay xà bao gồm cảm giác châm chích thoảng qua, kích ứng. Ống tai bị chấn thương hoặc viêm có thể dẫn đến các triệu chứng đau đớn

TƯNG TÁC THUỐC - NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY?

Không có báo cáo

Thông báo cho bác sĩ hoặc được sự mâu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng bất thường khi sử dụng thuốc này với các thuốc khác

CẤM LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUENN KHÔNG DÙNG THUỐC?

Nếu bạn quên liều tiếp theo, sử dụng thuốc ngày khai nhớ ra

Nếu bạn không chắc chắn cần làm gì sau khi bỏ lỡ một liều, liên hệ với bác sĩ hoặc được sự để được tư vấn

QUA LIU VÀ XỬ TRÉ: Thủa dung dịch nhỏ tai Etobat có thể rõ rệt rãy tai, điều trị bất kỳ tác dụng không mong muốn nào xuất hiện, ví dụ như kích ứng da

THÂN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Nếu cảm thấy đau hoặc viêm tai, nên ngừng sử dụng thuốc

Thuốc chứa propylene glycol có thể gây kích ứng da

Thuốc chứa paraben có thể gây phản ứng dị ứng (phản ứng quá mẫn muộn)

Thông báo cho bác sĩ hoặc được sự khi đang sử dụng hoặc gần đây có sử dụng loại thuốc khác, kể cả thuốc không kê đơn

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ: Etobat có thể sử dụng được cho phụ nữ có thai, dự định có thai hoặc cho con bú

ẢNH HƯỞNG ĐIỀU KHÁI NĂNG LÃI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa có báo cáo

KHÔNG NÃO CẨM THẨM VÀ BẮC SỸ, ĐƯỢC SÝ

Gặp phải bất cứ tác dụng không mong muốn nào khi sử dụng thuốc

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc được sự

CÁC ĐẶC DIỄM ĐƯỢC LỰC

Được lực học:

Các thuốc tai phản ứng đặc biệt: Các thuốc tai phản ứng đặc biệt (loại bỏ rãy tai)

Mã ATC: S02DC

Rãy tai có thể hơn 50 % chất béo do các tinh bột cerumenous tiết ra. Phần lớn rãy tai chứa các tế bào biểu mô da chết, các chất lỏng

bên ngoài và các lỗ rỗng. Các chất này tạo thành một màng lót giữ các hạt chất béo đã tạo thành khối rãy tai

Một lượng quá nhiều rãy tai có thể gây ngứa kèm, ù tai hoặc đau tai. Dung dịch nhỏ tai Etobat có sức căng bề mặt thấp và có khả năng trôi

lên, nhanh chóng xâm nhập vào màng lót của khối rãy tai khô, làm mềm rãy tai tạo thành các mảnh bẩn rắn, giúp dễ dàng vệ sinh tai hoặc trong các trường hợp nghiêm trọng hay mạn tính, rãy tai được đẩy ra bởi quá trình sinh lý bình thường.

Được động học:

Không có dữ liệu nghiên cứu về việc hấp thu toàn thân sau khi nhỏ thuốc vào tai. Tuy nhiên, bất cứ sự hấp thu nào có thể xảy ra thì khả năng hấp thu là rất thấp

BẢO QUẢN: Không quá 30 °C, tránh ánh nắng trực tiếp

TIỂU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở

HẠN SỬ DỤNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Ngày xem xét sửa đổi, cấp nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

Sản xuất bởi: MERAP

Công ty Cổ phần Tập đoàn Merap | 1- Tôn Tích, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam | www.merapgroup.com



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lê Minh Hùng