

EUPICOM SOFT CAPSULE

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
- Để thuốc xa tầm tay trẻ em.
- Không dùng thuốc quá hạn in trên bao bì.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất: Dexibuprofen 300,0 mg

Tá dược: Polyethylen glycol 400 245,0 mg, dầu caster polyoxyl 40 hydro hóa 20,0 mg, ethanolamin 15,0 mg, tocopherol acetat 10,0 mg, povidon 10,0 mg, gelatin 138,0 mg, glycerin đậm đặc 51,5 mg, dung dịch D-sorbitol 10,0 mg, ethyl vanillin vừa đủ, màu đỏ số 40 vừa đủ, nước tinh khiết vừa đủ.

MÔ TẢ: Viên nang mềm trong suốt màu vàng cam hình oval chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

DƯỢC LỰC HỌC:

Thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs), đồng phân của ibuprofen (ibuprofen là dạng racemic). Cơ chế tác dụng: ức chế enzym cyclooxygenase, làm giảm sự tạo thành prostaglandin và tromboxan A₂. Có tác dụng hạ sốt, giảm đau và chống viêm.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Hấp thu tốt khi uống, đạt nồng độ tối đa sau khoảng 90 phút. Liên kết với protein huyết tương khoảng 99%. Phân bố rộng rãi trong các mô cơ thể. Chuyển hoá chủ yếu ở gan thành dạng không hoạt tính rồi thải qua thận. Thời gian bán thải khoảng 2 giờ. Thức ăn làm chậm hấp thu nhưng không ảnh hưởng tổng lượng thuốc được hấp thu.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ

- Giảm đau, chống viêm trong các trường hợp: đau do viêm khớp cấp hoặc mạn, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp, viêm cứng khớp đột sống
- Các trạng thái viêm, đau sau chấn thương và phẫu thuật.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Liều lượng:
Người lớn và trẻ em từ 15 tuổi trở lên: 1 viên x 3-4 lần mỗi ngày, tùy mức độ đau.
Liều tối đa 4 viên mỗi ngày (không quá 1.200 mg dexibuprofen).
- Cách dùng: uống khi ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của chế phẩm.
- Bệnh nhân có cơ địa dị ứng hoặc hen; đặc biệt đã bị dị ứng hoặc hen khi dùng aspirin hoặc các thuốc chống viêm không steroid.
- Trẻ em dưới 15 tuổi.
- Phụ nữ có thai.
- Loét dạ dày tá tràng.
- Phối hợp với methotrexate.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Mẫn cảm với thuốc: ban da, hội chứng Steven Johnson.
- Buồn nôn, nôn, chán ăn, ỉa chảy hoặc táo bón, đau vùng thượng vị, xuất huyết tiêu hoá, loét hoặc thủng dạ dày, viêm dạ dày, viêm tụy.
- Sốc: có thể gặp do tụt huyết áp đột ngột hoặc mẫn cảm với thuốc. Cần thận trọng với người có cơ địa dị ứng. Nếu gặp, phải ngừng thuốc ngay và có biện pháp cấp cứu kịp thời.
- Trên hệ tạo máu: thiếu máu do tan máu, giảm bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu và giảm chức năng tiểu cầu, cần ngừng ngay thuốc khi có dấu hiệu bất thường về máu; theo dõi chặt chẽ khi điều trị.
- Thuốc làm che lấp các dấu hiệu nhiễm trùng, do đó cần theo dõi chặt chẽ và dùng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn.
- Nguy cơ huyết khối tim mạch (xem thêm phần Cảnh báo và thận trọng)
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.