



EURAX

(Kem bôi, Cortameton 10%)

THÀNH PHẦN:

Mỗi 1g kem bôi Eurax chứa:

Hoạt chất: Cortameton 100.00 mg

Ta được: Propylene glycol, glycerol monooleatyl, sarafin lỏng, polyoxy 40 alcohol, isopropyl myristat, cetyl oleylstearyl, nước tinh khiết.

DẠNG BẢO CHẾ CỦA THUỐC

Kem bôi mắt, hầu như màu trắng.

CÁCH DÙNG THUỐC:

Hộp 1 tuýp 20 g

CHỈ ĐỊNH:

Kem bôi Eurax được chỉ định để điều trị tại chỗ bệnh ngứa và ngứa.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Chỉ dùng ngoài da.

Thuốc diệt cái ghẻ bôi thuốc vào toàn bộ bề mặt cơ thể, tốt nhất là vào buổi tối. Bôi lặp lại trong 3-5 ngày, tùy thuộc vào kết quả. Phải thay khăn trải giường và quần áo lót. Sau khi hoàn tất điều trị, nên tắm rửa sạch sẽ.

Thuốc chống ngứa: Bôi thuốc vào vùng bị ngứa và thoa nhẹ nhàng, 2 hoặc 3 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG

- Chỉ dùng ngoài da.
- Không được sử dụng trong niêm mạc miệng và trong mắt hoặc xung quanh mắt vì thuốc dính vào mí mắt có thể dẫn đến viêm kết mạc. Trong trường hợp vô ý dính thuốc dính vào mắt hoặc niêm mạc miệng, phải rửa sạch dưới vòi nước.
- Không được bôi vào vết thương dị ứng, chàm (eczema) cấp, vết thương hở hoặc da bị viêm.

Khi bị phỏng chim hóa, cần điều trị, chăm sóc, thì trị ghê.



TRUNG TAM THUOC.COM **Trang này có thể gây lo lắng do**

- cộn cerostearyl có thể gây phản ứng da tại chỗ (viêm da tiếp xúc)

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

Không có nghiên cứu nào về tương tác được thực hiện.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Chưa có nghiên cứu có đối chứng về Euxal ở phụ nữ mang thai. Vì vậy không khuyến cáo sử dụng Euxal trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

Phụ nữ cho con bú

Chưa rõ hoạt chất của Euxal có đi vào sữa mẹ sau khi dùng tại chỗ hay không. Vì vậy bà mẹ cho con bú không nên sử dụng Euxal trừ khi có chỉ dẫn của bác sĩ.

ẢNH HƯỞNG LIÊN KHẢ NĂNG Lái XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Euxal không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Các phản ứng bất lợi được liệt kê dưới đây theo tần suất. Các tần suất được xác định như sau: R: gặp (~ 1/1.000 đến < 1/100), Hiếm gặp (~ 1/10.000 đến < 1/1.000) và rất hiếm gặp (< 1/10.000).

Độc toàn da và mô dưới da

Hiếm gặp:

Hiếm gặp: viêm da tiếp xúc, quá mẫn (bao gồm nổi ban da hoặc giống như nổi ban, chàm (eczema), ban đỏ, kích ứng da, phù mạch)

Phải ngưng điều trị nếu kích ứng nặng xảy ra.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUẢ LIỆU

Triệu chứng

Ministry of Consumer Affairs & Food Safety



Trong trường hợp vô ý nuốt phải, có thể quan sát thấy các triệu chứng ngộ độc cấp như buồn nôn, nôn, kích thích niêm mạc miệng, chảy dãi và da dấy. Các trường hợp hiếm gặp về mặt y học đã được báo cáo. Cần tiến hành các biện pháp trung cấp tại bộ thuốc và tìm kiếm sự trợ giúp y học.

CÁC TÁC DỤNG CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Chống chỉ định methemoglobin huyết, mặc dù rất hiếm gặp, trong trường hợp vô ý nuốt phải cũng như trong trường hợp hấp thụ qua da quá mức. Một trường hợp quá liều cotaximton (xem Euxax) hấp thụ qua da với ngộ ngộ methemoglobin huyết đã được báo cáo ở một trẻ 2.5 tháng tuổi sau khi bôi thuốc quá mức.

Điều trị

Các triệu chứng thường biến mất sau khi ngừng dùng thuốc, nhưng trong những trường hợp nặng có thể xem xét điều trị bằng xanh methylene.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

Đặc tính dược học học

Thuộc được lý trị liệu: thuốc chống ngứa khác (nhã ATC: D04AX0)

Cơ chế tác dụng

Cotaximton có tác dụng chống lại triệu chứng ngứa và là một thuốc diệt tại chỗ. Là một thuốc diệt tại chỗ, cotaximton có hiệu quả trên hệ vận động của các cơ chế bằng cách gây ngừng cử động tại ý không hồi phục.

Euxax sẽ đem lại tác dụng giảm kích ứng trong 5-10 giờ sau mỗi lần bôi thuốc.

Cotaximton có tác dụng kìm vi khuẩn, chống lại tụ cầu (staphylococci) và liên cầu (streptococci), có thể có lợi đối với các nhiễm khuẩn da trong trường hợp bệnh ngứa nghiêm trọng.

Các đặc tính dược động học:

Đồ Euxax ngoài da cho thấy cotaximton thẩm thấu vào da và vẫn còn tại độ sâu 24 giờ. Hoạt chất được giải phóng đều đặn vào máu rồi được đào thải nhanh chóng.

CÁC DỮ LIỆU AN TOÀN TIỀN LÂM SÀNG

Các dữ liệu tiền lâm sàng đối với cotaximton không cho thấy nguy cơ gây quái thai cũng không gây độc gen. Hien bởi Euxax dùng tại chỗ và tăng kín cho thế 1 lần/ngày trong 3 tháng đã được dùng nạp với các liều đến 200 mg/kg mà không có dấu hiệu độc tính ngoại trừ kích ứng da thoáng qua. Không quan sát thấy khả năng gây thay cảm hoặc nhạy cảm với ánh sáng trong các nghiên cứu tiền động vật.

TÍNH TƯƠNG Kỵ

Chưa được ghi nhận

HẠN DÙNG

30 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng in trên hộp thuốc.

HOANG ANH PHARMACY
CH-1250 MYSON 1

BẢO QUẢN



central
pharmacy

Đựng ở nhiệt độ 30°C, tránh nhiệt

trungtamthuoc.com

SẢN XUẤT BỞI:

Novartis Consumer Health SA

Route de l'Éclaz

1260 Nyon, Thụy Sĩ

Thông tin được cập nhật: 29/05/2012

**ĐỂ THUỐC XA TÂM NHÍNH VÀ TÂM VỜI CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ**

Novartis Consumer Health SA
CH-1260 NYON 1



ĐẠI LƯC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thành