

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ.
Để xa tầm tay trẻ em.

Viên nang mềm EYEBI®

SĐK: VD-15606-11

<https://trungtamthuoc.com/>

■ THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao Vaccinium Myrtillus (chứa Anthocyanosides) 50 mg

DL-alpha-tocopheryl acetate (Vitamin E) 50 mg

Tá dược: Dầu đậu nành, Lecithin, Dầu cọ, Dầu đậu nành hydro hóa một phần, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin đậm đặc, D-sorbitol, Methyl paraben, Propyl paraben, Ethyl vanillin, Titan dioxyd, Màu xanh dương số 1, Màu vàng số 5, Màu đỏ số 40, Nước tinh khiết.

■ CHỈ ĐỊNH

Hỗ trợ điều trị, cải thiện thị lực một số bệnh về mắt:

- Cận thị tiến triển và cận thị thoái hóa.
- Bệnh lý võng mạc và các rối loạn mạch máu mắt liên quan đến tiểu đường và tăng huyết áp.
- Quáng gà, suy giảm điều tiết mắt, viêm giác mạc, đau nhức mắt, mỏi mắt do tiếp xúc nhiều với máy tính, ti vi, trong thời kỳ thi cử, tập trung lái xe.
- Rối loạn thị giác lúc mờ tối và ban đêm.
- Đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm ở người lớn tuổi.

■ LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

- Người lớn: 3 – 6 viên/ngày.

- Trẻ em:

• Từ 5 – 7 tuổi: dùng đến 4 viên/ngày.

• Từ 8 – 12 tuổi: dùng đến 6 viên/ngày.

Thời gian điều trị là 20 ngày mỗi tháng, sau đó lặp lại nếu cần thiết.

■ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

■ THẬN TRỌNG

Không dùng quá liều khuyến cáo.

Nên hỏi ý kiến bác sĩ khi có hiện tượng rối loạn thị giác bất ngờ hay khi tình trạng rối loạn thị giác sẵn có trở nên xấu hơn.

■ TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có thông tin về trường hợp tương tác thuốc xảy ra.

■ PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Nên tránh dùng thuốc này ở phụ nữ có thai và đang cho con bú.

■ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có báo cáo.

■ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Rối loạn tiêu hóa: ợ nóng, buồn nôn và rối loạn tiêu hóa.

*** Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.**

■ **BẢO QUẢN:** Trong hộp kín, nơi khô mát, dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

■ **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.**

■ **ĐÓNG GÓI:** 10 vỉ x 10 viên nang mềm/ hộp.

03 vỉ x 10 viên nang mềm/ hộp.

■ **TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** Tiêu chuẩn cơ sở.

Sản xuất tại:

Công ty TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore,

Thuận An, Bình Dương, Việt Nam