

R

Thuốc kê đơn

## EYEDIN

**Thuốc này chỉ dùng theo đơn của thầy thuốc**

**Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.**

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

**Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc**

**Để xa tầm với của trẻ em**

### THÀNH PHẦN

Mỗi lọ 5ml dung dịch nhỏ mắt chứa:

**Hoạt chất:** Tobramycin sulphate tương đương Tobramycin ..... 15 mg (0,3% w/v)

**Tá dược:** Natri Sulphat, Boric Acid, Borax, Dinatri Edetat, Natri Metabisulphite, Polysorbate 80, Benzalkonium Chlorid natri, Nước cất pha tiêm

### ĐỘ QUỐC LỰC HỌC

Những nghiên cứu *in vitro* cho thấy rằng tobramycin có tác dụng chống lại những chủng vi khuẩn sau đây:

Staphylococci, bao gồm S. aureus và S. epidermidis (coagulase dương tính và coagulase âm tính), kể cả những chủng đề kháng với penicillin.

Streptococci, bao gồm một số loài liên cầu tan máu nhóm A, vài chủng không tan máu và một vài chủng Streptococcus pneumoniae.

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, Morganella morganii, hầu hết các chủng Proteus vulgaris, Hemophilus influenzae và H.aegyptius, Moraxella lacunata, Acinetobacter calcoaceticus và một vài loại Neisseria.

Những nghiên cứu về tính nhạy cảm của vi khuẩn cho thấy rằng trong một vài trường hợp những vi khuẩn đề kháng với gentamicin vẫn nhạy cảm với tobramycin.

### ĐỘ QUỐC ĐỘNG HỌC

Chưa có số liệu về mức độ hấp thu toàn thân của dung dịch thuốc nhỏ mắt Tobramycin. Tuy nhiên, người ta biết rằng có thể có sự hấp thu toàn thân đối với các thuốc dùng tại chỗ ở mắt.

### CHỈ ĐỊNH

Tobramycin là một kháng sinh điều trị tại chỗ trong những bệnh nhiễm khuẩn mắt do các vi khuẩn nhạy cảm gây ra viêm mi mắt, viêm giác mạc, viêm kết mạc, viêm túi lệ, ...

Khi dùng thuốc nhỏ mắt Tobramycin, nên theo dõi đáp ứng của vi khuẩn đối với liệu pháp kháng sinh tại chỗ. Các nghiên cứu lâm sàng đã cho thấy tobramycin an toàn và hiệu quả khi dùng cho trẻ em.

### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Với bệnh nhẹ và trung bình, nhỏ 1-2 giọt/lần, cứ 4 giờ nhỏ 1 lần. Trong trường hợp nhiễm trùng nặng, nhỏ 2 giọt/lần, cứ 1 giờ nhỏ 1 lần cho tới khi mắt được cải thiện thì giảm liều trước khi ngừng hàn thuốc.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định đối với các bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với một trong những thành phần của thuốc, người có bệnh thận và giảm thính lực.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Các tác dụng không mong muốn thường gặp nhất của thuốc nhỏ mắt Tobramycin là quá mẫn và nhiễm độc tại chỗ ở mắt (bao gồm: ngứa và sưng mi mắt, đỏ kết mạc) và gây độc với tiền đình và óc tai (đặc biệt ở những người bệnh có bệnh thận). Dưới 3% bệnh nhân được điều trị với Tobramycin có các tác dụng không mong muốn này. Các tác dụng không mong muốn tương tự có thể xảy ra khi dùng các kháng sinh khác thuộc nhóm aminoglycosid. Nếu dùng đồng thời dung dịch nhỏ mắt tobramycin với các kháng sinh toàn thân khác thuộc nhóm aminoglycosid, nên chú ý theo dõi nồng độ thuốc trong huyết thanh.

## THẬN TRỌNG

- Không tiêm thuốc nhỏ mắt Tobramycin vào mắt.
- Chỉ được dùng thuốc trong vòng một tháng sau khi đã mở nắp lọ.
- Như các kháng sinh khác, khi dùng kéo dài có thể gây ra sự phát triển quá mức của các vi sinh vật không nhạy cảm bao gồm cả nấm. Nếu có bội nhiễm, nên áp dụng phương pháp trị liệu thích hợp. Có thể xảy ra hiện tượng mẫn cảm cheo với các kháng sinh nhóm Aminoglycosid. Nếu có hiện tượng quá mẫn cảm với thuốc xảy ra, cần ngừng ngay thuốc và có biện pháp điều trị thích hợp.

## SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

*Sử dụng cho phụ nữ mang thai:* Tobramycin đã được chứng minh gây điếc bẩm sinh cả hai bên tai không hồi phục khi sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai. Vì vậy, cần phải cân nhắc lợi hại thật cẩn thận khi phải dùng thuốc này trong những tình trạng đe doạ tính mạng hoặc trong những bệnh nặng mà các thuốc khác không dùng được hoặc không có hiệu lực.

*Sử dụng ở người cho con bú:* Tobramycin được tiết vào sữa mẹ với lượng nhỏ. Tuy nhiên, thuốc rất ít được hấp thu qua đường uống và chưa có vấn đề gì với trẻ đang bú được thông báo.

## TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng.

## TƯƠNG TÁC THUỐC

Nếu thuốc nhỏ mắt Tobramycin được dùng đồng thời với các kháng sinh aminoglycosid khác, thì có thể gây tăng độc tính của thuốc và vì vậy cần phải theo dõi nồng độ thuốc trong huyết thanh.

## SỬ DỤNG QUÁ LIỀU

Trên lâm sàng, các triệu chứng điển hình của sự quá liều thuốc nhỏ mắt tobramycin (viêm kết mạc dạng châm, đỏ mắt, chảy nước mắt nhiều, phù và ngứa mi mắt) có thể giống như các tác dụng phụ ở một số bệnh nhân.

## ĐÓNG GÓI

Hộp 1 lọ 5 ml

## HẠN DÙNG

2 năm kể từ ngày sản xuất.

**Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.**

## BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô mát, tránh sánh sáng

## TCCL: Tiêu chuẩn cơ sở

Nhà sản xuất

MAKCUR LABORATORIES LTD.,

Địa chỉ: 46/5-6-7, Village: Zak, Tal. Dehgam, Dist: Gandhinagar-30, Gujarat State, India