

20/158/25

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**
Lần đầu: 05/3/2015

MẪU VỈ



Số lô SX, HD in chìm trên vỉ



MẪU HỘP



MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

THUỐC BẠN THÍCH DÙNG
ĐỂ XÃ THÌ TAY CỦA THẾ BẠN
ĐƯỢC KHUYẾT DẪM ĐI SỬ DỤNG THUỐC THUỐC KHAI THÔNG
THUỐC MÀY CÒN THÔNG THOẠI ĐÓN ĐÓN CỦA BÁC SĨ
KHÔNG CÁM NHƯỜNG THÂN XIN HỮU T KẾT CỨA BÁC SĨ

Đưa vào làn da phôi

FASCAPIN

TRÌNH DẠY: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phân. Hộp 10 hướng dẫn sử dụng.

CÔNG THỨC:

- Viên nén bao phân **FASCAPIN 50:**
 - Melipron 50mg
 - Tá dược: Hydroxy-Lactose, PVP K30, Magnesium stearat, Aerosil, ... và 1 viên nén bao phân
- Viên nén bao phân **FASCAPIN 20:**
 - Melipron 20mg
 - Tá dược: Hydroxy-Lactose, PVP K30, Magnesium stearat, Aerosil, ... và 1 viên nén bao phân

CÁC BẮC THUYẾT TÁC DỤNG:
 Các chất hoạt động dược: Melipron là thuốc ức chế men chuyển của angiotensin, có tác dụng ức chế một cách chọn lọc ở những động mạch thận, làm giảm áp lực máu tại các cơ quan, giảm sức kháng ngoại vi và giảm huyết áp.

Tác dụng phụ:

- Tăng đường huyết nhẹ
- Tăng lưu lượng máu ngoại biên và lưu lượng máu qua thận, não
- Tăng độ giãn của động mạch
- Màu da sạm da
- Kháng làm thay đổi hệ thống renin - angiotensin - aldosterone
- Kháng gây giữ nước - muối
- Kháng làm tăng lipit máu

Các phản ứng dị ứng:
 Thuốc được hấp thu nhanh và gần như hoàn toàn qua đường tiêu hóa, nhưng bị chuyển hóa trước một phần ở gan và sau đó được thải trừ qua thận với khoảng 40 - 70%.

Chỉ định:
 Điều trị tăng huyết áp đơn độc hoặc kết hợp, đặc biệt là các trường hợp tăng huyết áp đơn độc.

Liều lượng và cách dùng: Dùng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Chú ý:
 Không dùng chung với các thuốc khác có thể gây ra tác dụng phụ.

Tương tác thuốc:
 Không dùng chung với các thuốc khác có thể gây ra tác dụng phụ.

Chỉ định:
 Điều trị tăng huyết áp đơn độc hoặc kết hợp, đặc biệt là các trường hợp tăng huyết áp đơn độc.

Liều lượng và cách dùng: Dùng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Chú ý:
 Không dùng chung với các thuốc khác có thể gây ra tác dụng phụ.

Tương tác thuốc:
 Không dùng chung với các thuốc khác có thể gây ra tác dụng phụ.

Chỉ định:
 Điều trị tăng huyết áp đơn độc hoặc kết hợp, đặc biệt là các trường hợp tăng huyết áp đơn độc.

Liều lượng và cách dùng: Dùng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Chú ý:
 Không dùng chung với các thuốc khác có thể gây ra tác dụng phụ.

Tương tác thuốc:
 Không dùng chung với các thuốc khác có thể gây ra tác dụng phụ.

Chỉ định:
 Điều trị tăng huyết áp đơn độc hoặc kết hợp, đặc biệt là các trường hợp tăng huyết áp đơn độc.

Liều lượng và cách dùng: Dùng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Chú ý:
 Không dùng chung với các thuốc khác có thể gây ra tác dụng phụ.

Tương tác thuốc:
 Không dùng chung với các thuốc khác có thể gây ra tác dụng phụ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
 3 Trần Thành Tông - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
 Số 101
 Lô 27, KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam
 ĐT: 04.20474128

Hà nội, ngày 20 tháng 06 năm 2011

Nguyễn Văn Thanh
 Giám Đốc Trung Ương 2

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
 HÀ NỘI