



**Hướng dẫn sử dụng thuốc**

**FLAVITAL 500**

- **Dạng thuốc:** Viên nang cứng.
- **Quy cách đóng gói:** Hộp 5 vỉ x 10 viên.
- **Thành phần:** Mỗi viên nang cứng chứa:
  - Cao khô non hợp dược liệu
  - Tương ứng với các dược liệu
  - Thò ty tử (*Semen Cuscutae*)
  - Hà thủ ô đỏ (*Radix Fallopiae multiflorae*)
  - Dây đau xương (*Caulis tinosporae tomentosae*)
  - Cốt toái bồ (*Rhizoma Drynariae*)
  - Đỗ trọng (*Cortex Eucommiae*)
  - Cúc bắt tử (*Flos Helichrysi bracteati*)
  - Nấm sò khô (*Pleurotus otreatus*)
  - Tá dược vđ

550mg  
25mg  
25mg  
25mg  
25mg  
25mg  
25mg  
50mg  
500mg  
1 viên

(Tá dược gồm: Nipagin, nipasol, magnesi stearat, bột talc, colloidal silicon dioxide).

**- Công năng:**

- + Bổ gan thận, mạnh gân cốt, tráng dương, ích tinh
- + Nuôi dưỡng khí huyết ở người cao tuổi

**- Chủ trị:**

- + Trong các trường hợp thận yếu (Đau mỏi lưng, tiểu tiện đêm, giảm hoạt động sinh lý...).
- + Tăng cường sức khoẻ cho người cao tuổi (run rẩy, tê bì, suy kiệt,...).
- + Các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, mất ngủ. Khắc phục hội chứng tiền đình và phục hồi các tổn thương stress. Các biểu hiện rối loạn tuần hoàn não ở người cao tuổi như mất thăng bằng, hoa mắt...

**- Cách dùng và liều dùng:** Uống vào lúc đói.

Uống ngày 4 viên, chia 2 lần sáng và tối.

**- Chống chỉ định:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai và người cho con bú.

**- Kiêng kỵ:** Không nên ăn các thứ quá cay, nóng, sống, lạnh, khó tiêu trong thời gian dùng thuốc.

**- Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Chống chỉ định cho phụ nữ có thai và người cho con bú.

**- Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có tài liệu báo cáo.

**\* Ghi chú:** "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

**- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Hiện nay chưa có tương tác nào xảy ra với các thuốc khác. Thức ăn làm giảm khả năng hấp thu của thuốc do vậy nên sử dụng thuốc trước hoặc sau bữa ăn vài giờ để tăng khả năng hấp thu của thuốc.

**- Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

**\* Lưu ý:** Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, nang thuốc bị rách, bóp méo, bột thuốc chuyển màu, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.


**- Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

**- Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**

"**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ**"

**THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**  
Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội  
Số điện thoại: 04.33824685      Số fax: 04.33829054



**QUẢN LÝ DƯỢC**  
CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
*Đỗ Minh Hùng*