

**THÀNH PHẦN**

Mỗi viên nang mềm chứa:

- *Hoạt chất:* Arginin tidiacicat ..... 200 mg
- *Tá dược:* Dầu đậu nành, lecithin, palm oil, beeswax, gelatin, glycerin, sorbitol, nipagin, nipasol, ethyl vanilin, brilliant blue, tartrazin, allura red, oxyd sắt đỏ, oxyd sắt vàng, titan dioxyd.

**DƯỢC LỰC**

- Arginin tidiacicat là arginin thiazolidin-2,4-dicarboxylat. Thuốc tăng cường khử độc cho gan bằng cách cung cấp arginin cho chu trình urê để làm giảm nồng độ amoniac trong máu; tăng tạo glutathion nên tăng chuyển hóa các chất độc cho gan như dược phẩm, các yếu tố độc hại từ môi trường, thuốc lá, rượu... Ngoài ra, thuốc còn bảo vệ màng tế bào gan, làm giảm đáng kể nồng độ GOT huyết thanh (SGOT), GOT ty lạp thể (MGOT) và GPT huyết thanh (SGPT). Thuốc cũng có tác dụng ngăn ngừa sự tích tụ mỡ trong tế bào gan.
- Thuốc phục hồi chức năng của ty lạp thể và duy trì năng lượng cho hoạt động sinh lý, cải thiện chức năng chuyển hóa tế bào bằng cách làm tăng chuyển hóa của glucid, lipid, protid, tăng tổng hợp coenzym A và làm giảm nồng độ  $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -glutamyl-transpeptidase) trong máu và nghiệm pháp BSP (bromo-sulphthalein).

**DƯỢC ĐỘNG HỌC**

Arginin tidiacicat có chứa 2 gốc -N và -S, không bị bất hoạt bởi acid dịch vị, hấp thu tốt qua đường tiêu hóa.

**CHỈ ĐỊNH**

Thuốc hỗ trợ điều trị:

- Rối loạn chức năng gan.
- Suy gan, tình trạng tiền xơ gan.
- Viêm gan và viêm gan siêu vi B.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG**

- *Cách dùng:* Thuốc được dùng bằng đường uống, uống sau bữa ăn.
- *Liều lượng:* Liều thông thường là 1 viên/lần x 2 lần/ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**THẬN TRỌNG**

- Thuốc nên dùng với sự thận trọng ở trẻ em dưới 15 tuổi.
- Tính an toàn và hiệu quả của thuốc trên phụ nữ mang thai chưa được nghiên cứu đầy đủ, chỉ nên dùng thuốc cho phụ nữ mang thai khi thật cần thiết và phải có sự theo dõi chặt chẽ.

**TƯƠNG TÁC THUỐC**

Chưa có báo cáo về tương tác giữa arginin tidiacicat với các thuốc khác.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN**

Có thể gây tiêu chảy khi dùng thuốc ở liều cao.

**Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

- Bởi vì tính an toàn và hiệu quả trên phụ nữ có thai vẫn chưa được thiết lập, thuốc chỉ nên dùng ở phụ nữ có thai khi thật cần thiết.
- Chưa có đủ dữ liệu về sự bài tiết của thuốc qua sữa mẹ, thuốc chỉ nên dùng ở phụ nữ cho con bú khi thật cần thiết.

**QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ**

Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều arginin tidiacicat. Nếu xảy ra quá liều cần phải điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

**ĐÓNG GÓI:** Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm.

**TIÊU CHUẨN:** Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

**ĐỂ XATÀM TAY CỦA TRẺ EM****ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG****NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

Sản xuất tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM**

Số 43, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore,

Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 06503 769 606 - Fax: 06503 769 601