



TrungTamThuoc.com

*Giải pháp cho trào ngược dạ dày thực quản,
Lành dịu bỏng rát do acid dạ dày gây ra
Bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa*

Thành phần:

Mỗi viên nhai chứa:

- Sodium alginate.....200mg
- Alginic acid.....50mg
- Sodium bicarbonate.....80mg
- Calcium carbonate.....140mg

Tá dược: Mannitol, sucralose, silicon dioxide, vegetable magnesium stearate, glycerol behenate.

Hương liệu: dịch chiết gừng, dầu gừng, chanh, bạc hà.

Đặc điểm, thành phần và mục đích sử dụng:

Gastavit được dùng để chống lại hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản, bỏng rát đường tiêu hóa và các triệu chứng có liên quan đến trào ngược dạ dày. Gastavit giúp kiểm soát acid dịch vị, phòng ngừa bỏng rát, ợ nóng, đau dạ dày và chứng khó tiêu có liên quan. Gastavit hiệu quả trong việc điều trị nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, hơn nữa, nó còn được sử dụng hỗ trợ điều trị viêm dạ dày.

Cơ chế tác dụng:

Gastavit không được hấp thụ vào trong tuần hoàn, cơ chế tác dụng của sản phẩm là cơ chế vật lí, dựa trên sự hình thành gel nhớt của Natri alginat trong dạ dày. Trong môi trường acid dạ dày, chúng nhanh chóng hình thành 1 dạng gel nhớt và nhẹ, nổi trên đỉnh dạ dày và bao phủ niêm mạc dạ dày, làm cho việc di chuyển của dịch dạ dày đi lên khó khăn hơn, do đó làm giảm số lần trào ngược của dạ dày. Công thức có chứa natri alginate, axit alginic và bicarbonate, cho phép tác dụng nhanh hơn.

Liều dùng và cách dùng:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: nuốt (nhai) 2 viên sau mỗi bữa ăn chính.

Trẻ em (6 – 12 tuổi): nuốt (nhai) 1 viên sau mỗi bữa ăn chính với 1 cốc nước.

Phụ nữ có thai và cho con bú dùng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tác dụng không mong muốn:

Gastavit chứa các thành phần an toàn, tương thích sinh học và hấp thu tốt. Gastavit không chứa nhóm hydroxid hoặc aspartame, là những chất mà có thể gây ra nhiều tác dụng phụ. Ở liều khuyến cáo để đạt được tác dụng, chỉ một vài tác dụng không mong muốn được báo cáo lại là táo bón và tiêu chảy thoáng qua.

Nếu triệu chứng này kéo dài, cần tham khảo ý kiến bác sĩ

Chống chỉ định:

Trẻ em dưới 6 tuổi, táo bón mạn tính hoặc tiêu chảy, bệnh thận và suy tim mạn tính.

Bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần có trong sản phẩm

Tương tác với thuốc và thực phẩm chức năng:

Gastavit không có tương tác với thuốc và thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, theo quy định chung, cần uống thực phẩm chức năng, thuốc, vitamin trước hoặc sau 2h uống Gastavit.

Bảo quản:

Nhiệt độ dưới 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp

Hạn dùng: Xem trên bao bì sản phẩm

Đóng gói: Hộp 24 viên.

Nhà sản xuất: Apipharma d.o.o., Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, Croatia, EU