

MẪU HỘP DUNG DỊCH NHỎ MẮT GENTAMICIN

-----000-----

Kích thước thực của hộp : 2,8 cm x 7,0 cm x 2,8 cm



Ngày 17 tháng 01 năm 2012
Tổng Giám Đốc



DS. Lê Thanh Sĩ

MẪU NHÃN DUNG DỊCH NHỎ MẮT GENTAMICIN

-----000-----

Kích thước thực của nhãn : 6,4 cm x 1,8 cm



Ngày 07 tháng 07 năm 2011

Tổng Giám Đốc



DS. *Lê Thanh Sử*

**MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DUNG DỊCH NHỎ MẮT GENTAMICIN 0,3%**

Kích thước thực : 9,2 cm x 13,5 cm

GENTAMICIN 0,3%
Dung dịch nhỏ mắt

CÔNG THỨC : Cho 1 chai 5 ml

- Gentamicin sulfat tương ứng Gentamicin.....15 mg
- Tá dược: Natri clorid, Natri phosphat monobasic khan, Natri phosphat dibasic khan, EDTA Dinatri, Nipagin, Nipasol, Nước cất.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Gentamicin sulfat là kháng sinh có tác dụng diệt khuẩn qua ức chế quá trình sinh tổng hợp protein của vi khuẩn. Phổ diệt khuẩn của gentamicin thực tế bao gồm các vi khuẩn hiếu khí gram (-) và các tụ cầu khuẩn, kể cả các chủng tạo ra penicillinase và kháng methicilin.

DƯỢC LỰC HỌC:

Tác dụng chủ yếu tại chỗ.

CHỈ ĐỊNH :

Nhiễm trùng tại chỗ ở phần ngoài của mắt và phần phụ của mắt do những chủng vi khuẩn nhạy cảm bao gồm viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm giác kết mạc, loét giác mạc, viêm mí mắt, viêm kết mạc mí mắt, viêm tuyến Meibomius cấp và viêm túi lệ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN :

Có thể có rát tại chỗ hay phản ứng quá mẫn.

Thông báo cho bác sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG :

Sử dụng kháng sinh tại chỗ kéo dài có thể tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh của các mầm bệnh không nhạy cảm như nấm.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ :

Không ảnh hưởng.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có tài liệu nào công bố sử dụng tại chỗ quá liều.

LIỀU DÙNG :

Thông thường: Nhỏ 1 - 2 giọt vào mắt, 3 - 4 lần/ngày.

Thời gian điều trị từ 5 - 12 ngày.

TRÌNH BÀY :

Hộp 01 chai 5 ml.

BẢO QUẢN :

Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG :

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng sau khi mở nắp 15 ngày.

- Dung dịch nhỏ mắt Gentamicin 0,3% đạt theo TCCS.
- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.
- Sản xuất tại: Nhà máy GMP - WHO số 930 C2, đường C, KCN Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

F.T. PHARMA Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968

Email: duocpham32@ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com

Ngày 17 tháng 01 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sử