

Ginkgo 40

Cao Bạch quả 40mg



Mẫu nhãn hộp



Ginkgo 40

Cao Bạch quả 40mg



Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Sản xuất tại:
C. TY CP DƯỢC VYT T HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng - TP Hải Dương -ĐT (0320) 3853848 - 3858824

Ginkgo 40

Cao Bạch quả 40mg

Thành phần:
Mỗi viên nang mềm có chứa:
Cao bạch quả (Ginkgo Biloba Extract).....40mg
Tà được vđ.....1 viên

Tiêu chuẩn: TOCS

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C,
tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK:

Số lô sx:

Ngày sx:

HD:



Ginkgo 40

Cao Bạch quả 40mg



Box of 10 Blisters x 10 soft capsules

Sản xuất tại:
HAI DUONG PHARMACEUTICAL HEALTH MATERIALS, JSC
102 Chi Lăng street - Hai Duong Town - Tel: (0320) 3853848 - 3858824

Ginkgo 40

Cao Bạch quả 40mg

Chỉ định:
- Rối loạn tuần hoàn động mạch ngoại biên.
- Chóng mặt, ù tai.
- Rối loạn chức năng não với các triệu chứng sa sút trí tuệ, ù tai, đau đầu, giảm trí nhớ, không tập trung, trầm cảm, chóng mặt.

Liều dùng - cách dùng:
- Dùng theo đường uống.
- Mỗi lần uống 1 - 2 viên, ngày 2 - 3 lần.

Chống chỉ định:
- Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.

Các thông tin khác: Đọc kỹ bên trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Manufactured by:

HAI DUONG PHARMACEUTICAL HEALTH MATERIALS, JSC
102 Chi Lăng street - Hai Duong Town - Tel: (0320) 3853848 - 3858824



MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Mẫu nhãn hộp



Hộp 2 vỉ x 10 viên nang mềm

Ginkgo 40

Cao Bạch quả 40mg



Sản xuất tại:
C.TY CP DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng - TP. Hải Dương. ĐT: (0320) 3853848 - 3858824.

GMP WHO

Ginkgo 40
Ginkgo Biloba Extract 40mg
để XA TÂM TAY TRỀ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Ginkgo 40

Ginkgo Biloba Extract 40mg



Thành phần:
Mỗi viên nang mềm có chứa:
Cao bạch quả (Ginkgo Biloba Extract).....40mg
Tá dược vớ.....1 viên
Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C,
tránh ánh sáng.



Mẫu nhãn vỉ



Box of 2 Blisters x 10 soft capsules

Ginkgo 40

Ginkgo Biloba Extract 40mg



Manufactured by:
HAI DUONG PHARMACEUTICAL HEALTH MATERIALS, JSC
102 Chi Lang street - Hai Duong Town. Tel: (0320) 3853848 - 3858824.

GMP WHO

SDK:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

Chỉ định:

- Rối loạn tuần hoàn động mạch ngoại biên.
- Chóng mặt, ù tai.
- Rối loạn chức năng não với các triệu chứng sa sút trí tuệ: ù tai, đau đầu, giảm trí nhớ, không tập trung, trầm cảm, chóng mặt.

Các thông tin khác: Đọc kỹ bên trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Liều dùng - cách dùng:

- Dùng theo đường uống.
- Mỗi lần uống 1 - 2 viên, ngày 2 - 3 lần.

Chống chỉ định:

- Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.



Ginkgo 40
Cao Bạch quả 40mg
C.TY CP DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG



GMP WHO

SDK:
Số lô sx:
HD:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GINKGO 40

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao Bạch quả (Ginkgo biloba extract) 40mg

Tá dược: (Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Lecithin, Gelatin, Glycerin, Nipagin, Nipasol, Dung dịch Sorbitol 70%, Ethyl vanilin, Màu Green)vd 1 viên.

Chỉ định:

- Thiếu năng tuần hoàn não: Suy giảm trí nhớ, rối loạn tập trung, tâm trạng trầm cảm, chóng mặt, ù tai, nhức đầu.
- Rối loạn tuần hoàn ngoại biên: Hội chứng Raynaud, chứng đi cách hồi, chứng xanh tím đầu chi, hội chứng sau viêm tĩnh mạch. Rối loạn hệ thống tiền đình và ốc tai.

Chống chỉ định:

- Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.
- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Liều dùng - cách dùng:

Uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 2-3 lần.

Tác dụng không mong muốn:

Nhẹ và hiếm gặp, thường do dùng thuốc lâu ngày gây ra hiện tượng rối loạn tiêu hoá, nhức đầu, dị ứng da, có thể kéo dài thời gian đông máu. Những hiện tượng này sẽ mất đi khi ngừng thuốc.

"Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

Tương tác thuốc:

Không dùng cùng thuốc chống đông, thuốc cầm máu, thuốc kháng tiểu cầu, thuốc chỉ huyết

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc dùng được cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Quá liều và xử trí:

Chưa có báo cáo về việc sử dụng thuốc quá liều.

Không dùng quá liều chỉ định.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Trình bày: Hộp 2 vỉ x 10 viên, Hộp 5 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Chú ý: - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT NAM HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng TP Hải Dương

ĐT/ Fax : 0320.853848



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh