

113/89 G

https://trungtamthuoc.com

Handwritten signature



GINKOBIL Tablets
Ginkgo biloba ext. 40mg

Composition: Each tablet contains:
Ginkgo biloba leaf extract 40mg
(as ginkgo flavonglycosides 9,6mg)

Indication, dosage and administration, contraindication, note, side effect, others information:
See insert the paper.

Dosage form: film coated tablet


Route of administration: Oral

Storage conditions:
Store in contain below 30°C

Packing: 10 tablets/blister x 10 blisters/box

Specification: In house

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE INSERT CAREFULLY BEFORE USE



GINKOBIL Tablets
Ginkgo biloba ext. 40mg

Thành phần: Mỗi viên nén chứa
Cao khô lá bạch quả
(*Extractum Folium Ginkgo*) 40mg
(Tương đương 9,6mg Ginkgo flavon glycosides)

Chỉ định, liều dùng, chống chỉ định, lưu ý, tác dụng phụ, các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn kèm theo

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Đường dùng: Đường uống

Bảo quản: Trong bao bì kín ở nhiệt độ dưới 30°C

Quy cách: 10 viên/vi x 10 vi/hộp

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất

Visa No./SDK:
Lot No./Số lô SX:
Mfg.date/NSX:
Exp.date/HD: THERAGEN ETEX CO., LTD
DNNK:

ĐỀ XA TÀM TAY TRÉ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 9/2/15



Handwritten signature
PRESIDENT Ji, Kyu Won

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

GINKOBIL

[Thành phần] Mỗi viên chứa:

Cao khô lá bạch quả (*Extractum Folium Ginkgo*) 40 mg

(Tương đương 9,64mg Ginkgo flavon glicosides)

Tá dược: Microcrystalline Cellulose, Lactose Monohydrat, Corn Starch, Carboxymethylcellulose Calcium, Magnesi Stearat, Hypromellose, Polyethylene Glycol 6000, Titan Oxid, Màu vàng số 4, Màu xanh số 1

[Dược lực học]

Chiết xuất của Ginkgo biloba có tác dụng điều hòa vận mạch trên toàn bộ mạch máu: Động mạch, mao mạch, tĩnh mạch. Tác dụng phụ thuộc vào liều lượng và thay đổi tùy theo tính chất, đường kính và nguồn gốc mô của mạch máu và tùy theo cả trương lực và tình trạng của thành mạch, kích thích sự tiết EDRF từ nội mô. Chiết xuất của Ginkgo biloba chống lại sự co thắt động mạch, gây giãn tiểu động mạch và ngược lại làm co tĩnh mạch, điều hòa độ giãn tĩnh mạch đáp ứng với các thay đổi tư thế, giảm tính thấm quá độ của mao mạch và tăng cường sức bền mao mạch. Chiết xuất của Ginkgo biloba chống phù mạch ở não lẫn ngoại biên, che trở hàng rào máu – não và máu – võng mạc.

[Dược động học]

Ở động vật, sau khi cho uống chiết xuất của Ginkgo biloba có đánh dấu bằng C14, nghiên cứu về sự hấp thụ và phân phối của sản phẩm cho thấy sự hấp thụ EGb nhanh và hoàn toàn. Sự cân bằng phóng xạ vào 72 giờ sau cho thấy sự thải ra trong CO₂ thở ra và trong nước tiểu. Đo phóng xạ trong máu theo thời gian lập nên những thông số dược động học và thời gian bán hủy sinh học khoảng 4 giờ 30 phút. Định phóng xạ trong máu đạt được sau 1 giờ 30 phút cho thấy sự hấp thụ xảy ra ở phần trên của hệ tiêu hóa.

[Chỉ định]

Điều trị rối loạn mạch máu não và rối loạn mạch ngoại vi.

Điều trị bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ, ù tai .

[Liều lượng và cách dùng]

- Điều trị rối loạn mạch máu não và rối loạn mạch ngoại vi: Uống 1 viên x 3 lần mỗi ngày hoặc uống 2 viên x 2 lần mỗi ngày

- Điều trị bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ, ù tai: Uống 1-2 viên x 3 lần mỗi ngày.

[Thận trọng]

THERAGEN E'

PRESIDENT'

- Thận trọng khi dùng cho người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu; không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, không dùng cho pha nhồi máu não, tim cấp, xuất huyết não; không dùng đồng thời với các thuốc có tác dụng chi huyết

- Dùng thuốc đúng liều lượng và cách dùng theo tờ hướng dẫn sử dụng.

- Do an toàn và hiệu quả của thuốc trên trẻ em chưa được đánh giá, không dùng thuốc cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai

Chưa có dữ liệu nghiên cứu đầy đủ trên phụ nữ mang thai, thận trọng khi dùng cho người mang thai.

Thời kỳ cho con bú

Chưa có dữ liệu nghiên cứu đầy đủ trên phụ nữ đang cho con bú, thận trọng khi dùng cho người đang cho con bú.

Tác động của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc: Thận trọng khi dùng cho người lái xe và vận hành máy móc vì thuốc có thể gây đau đầu, chóng mặt.

[Chống chỉ định]

Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em dưới 12 tuổi

Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, không dùng cho pha nhồi máu não, tim cấp, xuất huyết não; không dùng đồng thời với các thuốc có tác dụng chi huyết

[Tác dụng phụ]

Các tác dụng phụ bao gồm đau đầu, chóng mặt, đánh trống ngực, rối loạn tiêu hóa, rối loạn chảy máu, và phản ứng quá mẫn da

Thông báo cho bác sỹ nếu có bất cứ phản ứng phụ nào xảy ra khi dùng thuốc

Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của thầy thuốc

[Tương tác thuốc]

Thuốc có thể làm tăng tác dụng của thuốc chống đông máu.

[Quá liều]

Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều

[Đóng gói] 10 viên/vi x 10 vi/hộp

[Dạng bào chế]: Viên nén bao phim

1. 10/10
10/10
10/10

Handwritten signature

3X CC

[Đường dùng]: Đường uống

[Hạn dùng]: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

[Bảo quản] Bảo quản trong bao bì kín ở nhiệt độ dưới 30⁰C

[Tiêu chuẩn] Nhà sản xuất

Nhà sản xuất

THERAGEN ETEX CO., LTD

#649-1, Choji-Dong, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea

THERAGEN ETEX CO., LTD.

Ji, Kyu Won
PRESIDENT



TUQ. CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hùng

[Handwritten signature]

LTD.