

Tài liệu tập huấn lưu hành nội bộ không dùng để quảng cáo

central
pharmacy
TrungTamThuoc.com

GRAMKILL

Cefdinir 125mg

KHÁNG SINH THẾ HỆ MỚI ĐIỀU TRỊ BỆNH:

- ✓ **NHIỄM KHUẨN TAI MŨI HỌNG**
- ✓ **NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI**
- ✓ **NHIỄM KHUẨN DA MÔ MỀM**

BESTPHARM GROUP
BESTPHARM KOREA
gramkill@gmail.com

SDK: VD-23389-15

GRAMKILL

Cefdinir 125mg

Thành phần: Mỗi gói bột (2,5g) chứa:

Hoạt chất: Cefdinir.....125mg

Tá dược: Lactose khan, Aspartam, L-HPC (Low-substituted hydroxypropyl cellulose), Natri benzoate, Colloidal silicon dioxide, Magnesi stearate, Mùi dâu, Ethyl vanillin.

Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống.

Chỉ định:

*GRAMKILL được chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn nhẹ và trung bình gây nên bởi các vi khuẩn nhạy cảm trong các trường hợp sau:

- **Trẻ em (từ 6 tháng đến 12 tuổi):** Viêm tai giữa cấp, viêm họng/viêm amidan, nhiễm trùng da và cấu trúc da không biến chứng.

Liều dùng và cách dùng:

Trẻ em (từ 6 tháng đến 12 tuổi):

Liều dùng và thời gian điều trị các nhiễm khuẩn ở trẻ em: Tổng liều dùng hàng ngày trong điều trị tất cả các loại nhiễm khuẩn là 14mg/kg thể trọng, có thể lên đến tối đa 600mg/ngày.

***Liều lượng và cách dùng:** Uống 2 lần/ngày, dùng 5 - 10 ngày.

- Trẻ em từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi: 2 gói/ngày, chia làm 2 lần, dùng 5-10 ngày.

- Trẻ em từ 5-10 tuổi: Uống 3 - 4 gói, chia làm 2-3 lần/ngày, dùng 5-10 ngày.

- Trẻ em trên 12 tuổi: Uống 4 - 8 gói/ngày, chia làm 2 lần, dùng 5 - 10 ngày.

Cách pha: Đổ gói thuốc vào ly nhỏ. Thêm khoảng 5ml nước, khuấy đều và uống ngay.

Chống chỉ định:

Người bệnh dị ứng với kháng sinh nhóm cephalosporin.

Bảo quản: Bảo quản trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: Xem trên bao bì sản phẩm.

Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói.

PHIL INTER PHARMA