

MẪU NHÃN

Nhãn tuýp 10 g:

Rx - thuốc bán theo đơn

HANOMAC

Topical Cream

Thuốc KEM BÔI DA

Cream 10g

Mỗi tuýp 10g có chứa:

Dexamethason acetat.....5mg

Clotrimazol.....100mg

Gentamicin.....10mg

Tá dược vừa đủ.....10g

Rx - thuốc bán theo đơn

HANOMAC

Topical Cream

Thuốc KEM BÔI DA

Cream 10g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Lô 15 - Khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

GMP-WHO

N:0101337659-C.T.C.P

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nhãn hộp 1 tuýp 10 g:

Công thức:

Mỗi tuýp 10g có chứa:

Dexamethason acetat..... 5mg

Clotrimazol..... 100mg

Gentamicin.....10mg

Tá dược vừa đủ.....10g

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK :

Số lô SX:

NSX:

HD:

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC

DS. *Phạm Thị Tuấn*

Rx Thuốc bán theo đơn

HANOMAC Cream

Topical Cream

Thuốc kem bôi da

Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Lô 15, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Hộp 1 tuýp 10g

GMP - WHO

HANOMAC

CHỈ ĐỊNH:

- Viêm da dị ứng hoặc do tiếp xúc đáp ứng với corticoid tại chỗ và có dấu hiệu bội nhiễm hoặc vi nấm: Chàm cấp và mãn tính, vết côn trùng cắn, viêm da do tiếp xúc, viêm da tăng tiết bã nhờn, viêm da bong vảy, mề đay dạng dát sần, vẩy nến, lichen phẳng mạn tính

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH,

CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

BẢO QUẢN: Để nơi khô, nhiệt độ từ 15 - 30°C, tránh ánh sáng

Rx Thuốc bán theo đơn

HANOMAC Cream

Topical Cream

Thuốc kem bôi da

Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Lô 15, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Hộp 1 tuýp 10g

GMP - WHO

HANOMAC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kem bôi da HANOMAC

1. Công thức: Cho 1 tuýp 10g

Dexamethason acetat	5,0 mg
Clotrimazol	100,0mg
Gentamicin sulfat	
tương đương với Gentamicin	10,0 mg

Tá dược (Methyl paraben, Propyl paraben, dầu paraffin, acid stearic, alcol cetylic, alcol stearylic, propylen glycol, vaselin, natri lauryl sulfat, nước tinh khiết) vừa đủ 10 g

2. Dạng bào chế: Kem bôi da

3. Chỉ định:

Viêm da dị ứng hoặc do tiếp xúc đáp ứng với corticoid tại chỗ và có dấu hiệu bội nhiễm hoặc vi nấm: Chàm cấp và mạn tính, vết côn trùng cắn, viêm da do tiếp xúc, viêm da tăng tiết bã nhờn, viêm da bong vảy, mề đay dạng dát sần, vẩy nến, liken phẳng mạn tính

4. Cách dùng, liều dùng:

- Thoa một lớp mỏng lên vùng da bị bệnh. 2-3 lần/ngày.
- Để việc điều trị hữu hiệu, nên dùng thuốc đều đặn. Vệ sinh sạch sẽ vùng da bị bệnh trước khi dùng thuốc

5. Chống chỉ định:

- Người mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Không bôi thuốc vào mắt.
- Nhiễm khuẩn da do lao, giang mai, virus.
- Mụn trứng cá đỏ, tổn thương có loét
- Loét trên da.
- Nhiễm nấm ngoài tai kèm thủng màng nhĩ.

6. Tác dụng không mong muốn:

- Kích thích da, ban đỏ, nổi mề đay.
- Dùng lâu ngày có thể gây teo da, rạn da, rậm lông.
- Ức chế tuyến thượng thận có thể xảy ra khi dùng liều cao trong thời gian dài và kỹ thuật băng ép.

"Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

7. Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi sử dụng:

- Cần tránh thoa thuốc lớp dày, diện tích rộng, tránh dùng thuốc kéo dài và băng kín vết thương trừ những trường hợp đặc biệt để ngăn sự hấp thu toàn thân.
- Không dùng trên vết thương hở
- Không nên dùng cho trẻ sơ sinh
- Đối với trẻ em: Khi dùng thuốc này liều cao, trong thời gian dài bằng kỹ thuật băng ép (tã lót cũng có tác dụng tương tự kỹ thuật băng ép) đã cho thấy là có tác dụng làm giảm sự phát triển của cơ thể.

8. Tương tác với các loại thuốc khác: Không.

9. Sử dụng quá liều:

- Quá liều: Sử dụng corticoid tại chỗ liều cao kéo dài có thể làm ức chế tuyến thượng thận gây ra bệnh Cushing.
- Xử trí: Các triệu chứng tăng tiết tuyến thượng thận cấp thường là có

hồi phục. Điều chỉnh mất cân bằng điện giải nếu cần thiết. Trong trường hợp ngộ độc mãn tính do không có thuốc điều trị đặc hiệu nên ngưng thuốc từ từ. Nếu xuất hiện sự bội tăng các vi khuẩn không nhạy cảm, ngưng sử dụng thuốc và áp dụng phương pháp điều trị thích hợp.

10. Các đặc tính dược lực học:

- HANOMAC có phổ điều trị rộng đối với các bệnh ngoài da do sự kết hợp tác dụng kháng viêm, chống ngứa và co mạch của Dexamethason acetate với tác dụng kháng nấm phổ rộng của Clotrimazol và tác dụng kháng khuẩn phổ rộng của Gentamicin.

- Dexamethason acetate là fluomethylprednisolon, một glucocorticoid tổng hợp với cơ chế tác dụng trực tiếp hoặc gắn kết vào thụ thể ở tế bào, chuyển vị vào nhân tế bào và ở đó đã tác động đến 1 số gen được dịch mã. Dexamethason có tác dụng chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch để điều trị các rối loạn ngoài da như: viêm da, viêm da dị ứng

- Clotrimazol là thuốc chống nấm phổ rộng với cơ chế là liên kết với các phospholipid trong màng tế bào nấm, làm thay đổi tính thấm của màng, gây mất các chất thiết yếu nội bào dẫn đến tiêu huỷ tế bào nấm. Clotrimazol có tác dụng kìm hãm và diệt nấm trên các chủng *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis* và các loài *Candida*.

- Gentamicin là một kháng sinh thuộc nhóm aminoglycosid có tác dụng diệt khuẩn qua ức chế quá trình sinh tổng hợp protein của vi khuẩn. Phổ diệt khuẩn của gentamicin bao gồm vi khuẩn hiếu khí Gram âm và các tụ cầu khuẩn như *Staphylococcus saprophyticus*, *Salmonella typhi* và *E. coli*, *H. influenzae*, *Shigella flexneri*, tụ cầu vàng, *S. epidermidis*. Gentamicin cho tác dụng điều trị tại chỗ rất hữu hiệu trong các nhiễm trùng ngoài da tiên phát hay thứ phát.

11. Các đặc tính dược động học:

Mức độ thuốc qua da và tác dụng toàn thân phụ thuộc vào diện tích bôi thuốc, mức độ thay đổi của da, thời gian điều trị. Thuốc hấp thu được qua da khi bôi, đặc biệt khi băng kín hoặc da bị tổn thương, dùng bôi dài ngày.

12. Bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ 15 - 30°C, tránh ánh sáng.

13. Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

14. Đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g

15. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Trụ sở chính:

170 Đường La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Tel: 043.5116142 - Fax: 0438511280

Cơ sở sản xuất:

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Lô 15, Khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

Tel: 043.5250738