

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 03/11/16



HANVIDON®

Eye Drops
Povidone 20mg/mL

10mL



Manufactured by
HANLIM PHARM. CO., LTD.
227, Songnam-ro, Chonan-gu, Gongju-si, Chungcheong-do, Korea

[Composition]
Each bottle (10mL) contains
Povidone200mg

[Pharmaceutical form]
Ophthalmic solution.

[Indication, Dosage and Administration, Contraindications and other information]
Please see insert-paper.

[Storage]
Store in a tight container,
cool dry place below 30°C.

[Package] 10mL bottle/box.

Keep out of reach of children.
Read insert paper carefully
before use.

HANVIDON®

Thuốc tra mắt
Povidone 20mg/mL

10mL



Sản xuất tại
HANLIM PHARM. CO., LTD.
227, Songnam-ro, Chonan-gu, Gongju-si, Chungcheong-do, Korea

[Thành phần]
Mỗi lọ (10mL) chứa
Povidone 200mg

[Dạng bào chế]
Dung dịch nhỏ mắt.

[Chỉ định, Liều dùng và cách dùng, Chống chỉ định và các thông tin khác]
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

[Bảo quản]
Bảo quản trong bao bì kín, nơi
khô mát dưới 30°C.
[Đóng gói] Lọ 10mL/hộp.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng.

SDK :

:NND

:DH

:XSN

:XS 01 01



[Composition/Thành phần]
Each bottle (10mL) contains/
Mỗi lọ (10mL) chứa
Povidone 200mg

HANVIDON®
Eye Drops

10mL

Số lô SX:

HD:

HANLIM PHARM. CO., LTD. KOREA



*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ*

HANVIDON

■ THÀNH PHẦN

Mỗi mL chứa:

Hoạt chất: Povidone20mg

Tá dược: Benzalkonium clorid, acid boric, natri clorid, natri hydroxyd, nước pha tiêm.

■ DẠNG BÀO CHẾ

Dung dịch nhỏ mắt.

■ CHỈ ĐỊNH

Khô mắt, mang kính sát tròng cứng.

■ LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Thuốc chỉ dùng để nhỏ vào mắt

Mỗi lần nhỏ 1-2 giọt, 4-5 lần/ngày.

Liều dùng có thể được điều chỉnh tùy theo mức độ của triệu chứng.

■ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

■ THẬN TRỌNG

- Tránh mang kính sát tròng mềm trong thời gian điều trị.

- Để tránh nhiễm khuẩn, không để đầu nhỏ giọt của lọ thuốc chạm vào mắt

- Không dùng chung lọ thuốc với người khác để tránh lây nhiễm.

■ TƯƠNG TÁC THUỐC

Nếu bệnh nhân đồng thời dùng thuốc này và các thuốc nhỏ mắt khác (ví dụ điều trị glaucom), nên nhỏ các thuốc cách nhau ít nhất 5 phút. Nên nhỏ HANVIDON sau khi nhỏ thuốc kia.

■ SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chưa có đầy đủ những nghiên cứu về việc sử dụng thuốc ở phụ nữ có thai và cho con bú. Nếu có thai hoặc đang cho con bú, bệnh nhân cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc HANVIDON.

■ ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

■ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Rất hiếm khi xảy ra phản ứng quá mẫn.

* Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ gặp phải khi sử dụng thuốc.



■ **SỬ DỤNG QUÁ LIỀU**

Các dấu hiệu lâm sàng và các triệu chứng khi dùng quá liều thuốc nhỏ mắt HANVIDON có thể tương tự như tác dụng không mong muốn xảy ra ở một vài bệnh nhân.

■ **BẢO QUẢN:** Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô mát dưới 30°C.

■ **HẠN DÙNG:** 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Dùng thuốc trong vòng 1 tháng kể từ ngày mở nắp lọ.

* *Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.*

■ **ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 lọ 10mL.

Sản xuất bởi:

HANLIM PHARM. CO., LTD.

2-27, Yeongmun-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hùng

