

Rx Thuốc bán theo đơn

HASANBIN

Viên nén bao phim

Thành phần

- Dược chất:

Hasanbin 100: Trimebutin maleat 100 mg.

Hasanbin 200: Trimebutin maleat 200 mg.

- Tá dược: Lactose monohydrat, cellulose vi tinh thể 101, acid citric khan, natri starch glycolat, povidon K30, silic dioxyd keo khan, magnesi stearat, HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, talc, titan dioxyd.

Dược lực học

Trimebutin dạng base và dạng muối maleat có tác dụng chống co thắt, được sử dụng trong điều trị triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Trimebutin cũng được báo cáo có hiệu quả trong điều trị hội chứng ruột kích thích. Cơ chế tác động của trimebutin gián tiếp thông qua các thụ thể opioid ở dạ dày – ruột và điều hòa quá trình phóng thích các peptid dạ dày – ruột.

Dược động học

- Trimebutin maleat được hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa. Nồng độ thuốc trong huyết tương đạt được khoảng 1 – 2 giờ sau khi uống.
- Trimebutin được đào thải nhanh, chủ yếu qua nước tiểu, khoảng 70% thuốc được đào thải sau 24 giờ.

Chỉ định

- Điều trị triệu chứng đau do rối loạn chức năng của ống tiêu hóa và đường mật.
- Điều trị triệu chứng đau, rối loạn sự vận chuyển bất ổn ở ruột có liên quan đến rối loạn chức năng của ruột.

Liều lượng và cách dùng

Liều lượng:

600 mg trimebutin maleat/ngày, chia làm nhiều lần uống.

Cách dùng:

Dùng đường uống.

Chống chỉ định

Quá mẫn với trimebutin maleat hay bất cứ thành phần nào của thuốc.

Tác dụng phụ

Các nghiên cứu lâm sàng đã ghi nhận rất hiếm khi xảy ra các phản ứng ở da.

Thận trọng

Không khuyến cáo sử dụng Hasanbin 100 và Hasanbin 200 ở trẻ em dưới 12 tuổi.

Tương tác thuốc và các dạng tương tác khác

Chưa có thông tin đầy đủ về tương tác thuốc của trimebutin maleat.

Quá liều và cách xử trí

Điều trị triệu chứng trong trường hợp quá liều.

Sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú

Phụ nữ mang thai:

Thử nghiệm tiền lâm sàng cho thấy trimebutin maleat không gây quái thai trên động vật. Chưa có dữ liệu đầy đủ về tính an toàn của trimebutin maleat khi sử dụng cho phụ nữ có thai. Vì vậy, không nên sử dụng thuốc trong 3 tháng đầu thai kỳ và chỉ dùng trong 3 tháng giữa và cuối thai kỳ khi thật sự cần thiết.

Phụ nữ cho con bú:

Trimebutin maleat có thể sử dụng ở phụ nữ cho con bú. Trong thời gian dùng thuốc, người mẹ vẫn có thể cho con bú.

Tác động của thuốc khi vận hành tàu xe, máy móc

Chưa có thông tin về tác động của trimebutin maleat lên khả năng vận hành tàu xe, máy móc.

Trình bày

Hộp 03 vi x 10 viên nén bao phim. Vi bấm Al/PVC trong.

Hộp 05 vi x 10 viên nén bao phim. Vi bấm Al/PVC trong.

Hộp 10 vi x 10 viên nén bao phim. Vi bấm Al/PVC trong.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng: 36 tháng (kể từ ngày sản xuất).

Lưu ý

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.

Không dùng thuốc quá liều chỉ định.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.



CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM
Lô B, đường số 2 - KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam