

Hướng dẫn sử dụng thuốc:

HASTASTEN



- **Dạng thuốc:** Kem bôi da
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 1 tuýp x 5g .

- **Thành phần:** Clotrimazol 50mg
Tá dược vd 5g

(Tá dược gồm: Propylene glycol, Cetosteryl alcohol, Cremophor A₆, Cremophor A₂₅, Butyl hydroxytoluen, Dinatri Eddet, Dầu parafin, Nước tinh khiết).

- **Các đặc tính dược lực học:** Clotrimazol thuộc dẫn xuất imidazol tổng hợp có đặc tính chống nấm phô rộng. Thuốc được dùng để điều trị các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm các loài nấm gây bệnh khác nhau và cũng có tác dụng trên *Trichomonas*, *Staphylococcus* và *Bacteroides*. Không có tác dụng với *Lactobacilli*.

Cơ chế tác động của Clotrimazol là liên kết với các phospholipid trong màng tế bào nấm làm thay đổi tính thẩm của màng, gây mất các chất thiết yếu nội bào dẫn đến tiêu huỷ tế bào nấm. Invitro, clotrimazol có tác dụng kìm hãm và diệt nấm, tuy theo nồng độ, với các chủng *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporon canis* và các loài *Candida*.

- **Các đặc tính dược động học:** Thuốc bôi ngoài da nên có tác dụng tại chỗ nơi bôi thuốc, thuốc ít được hấp thu. Sau 6 giờ bôi kem trên da nguyên vẹn và da bị viêm cấp, nồng độ clotrimazol thay đổi từ 100microgam/cm² trong lớp sừng đến 0,5 - 1 microgam/cm² trong lớp gai và 0,1 microgam/cm² trong lớp mô dưới da.

- **Chi định:**

* Bệnh nấm; bệnh nấm ngoài da do *dermatophytes*; do nấm men (*Candida spp*); nấm mốc và các loại vi nấm khác.

* Bệnh da bôi nhiễm do các loại vi nấm kể trên như nấm ở giữa các ngón tay, ngón chân, bệnh nấm da và ở các nếp da, lang ben, bệnh nấm đỏ, nấm móng, nấm da đầu.

- **Cách dùng và liều dùng:** Rửa sạch vùng da bị bệnh. Bôi một lớp mỏng kem lên vùng da bị nhiễm 2 lần mỗi ngày. Bôi thành lớp mỏng và xoa đều để thuốc thẩm sâu vào biểu bì. Nếu bệnh không đỡ sau 4 tuần điều trị, cần phải xem lại chẩn đoán. Bệnh thường đỡ sau 1 tuần. Có khi phải điều trị đến 8 tuần.

- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

- **Thận trọng:** Không được bôi lên niêm mạc hay trong mắt. Phải điều trị đủ thời gian mặc dù các triệu chứng có thuyên giảm. Thông báo cho thầy thuốc khi có biểu hiện tăng kích ứng ở vùng bôi thuốc (đỏ, ngứa, bong, mụn nước, sưng), dấu hiệu của sự quá mẫn. Tránh các nguồn gây nhiễm khuẩn hoặc tái nhiễm.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Chỉ dùng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú khi có chỉ định cụ thể của thầy thuốc.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Các phản ứng tại chỗ bao gồm bong nhẹ, kích ứng, viêm da dị ứng do tiếp xúc, đau rát vùng bôi thuốc.

* **Ghi chú:** "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Clotrimazol có thể đối kháng với tác dụng của amphotericin và các kháng sinh có nhiều nối đôi, khi dùng ngoài da.

- **Quá liều và cách xử trí:** Không có hiện tượng quá liều hay ngộ độc khi bôi thuốc ngoài da.

- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.** Khi thấy thuốc có biểu hiện tách lớp, không dính vào da, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. **ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM.**

- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"