

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 05/07/2018

# Carsantin® 12,5 mg


Hộp 03 vỉ x 10 viên nén  
 Kích thước: 97 x 45 x 18 mm



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
 DS. Trần Đình Hương

# Carsantin® 12,5 mg


Hộp 10 vỉ x 10 viên nén  
Kích thước: 97 x 45 x 47 mm



TỔNG GIÁM ĐỐC  
ĐS. Trần Đình Hương

# Carsantin® 12,5 mg

Viên nén  
Kích thước: 40 x 92 mm



TỔNG GIÁM ĐỐC  
DS. *Trần Đình Hương*



Thông tin thuốc dành cho bệnh nhân

Carsantin®

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.
Đề thuốc xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THÀNH PHẦN, HẠM LƯỢNG CỦA THUỐC

Dược chất:
Carsantin® 6,25 mg: Carvedilol 6,25 mg
Carsantin® 12,5 mg: Carvedilol 12,5 mg
Tá dược: Cellulose vi tinh thể, silic dioxyd keo khan, magnesii stearat

MỘT SỐ SẢN PHẨM

Carsantin® 6,25 mg & Carsantin® 12,5 mg: Viên nén tròn, màu trắng, hai mặt phẳng, một mặt có khắc rãnh ngang, cạnh và thành viền lãnh lãnh.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Carsantin® 6,25 mg & Carsantin® 12,5 mg:
Hộp 03 vỉ x 10 viên nén /V1băm A1 - PVC/PVDC trắng đục.
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén /V1băm A1 - PVC/PVDC trắng đục

THUỐC DÙNG CHO BỆNH GI

Carsantin® chứa hoạt chất carvedilol thuốc nhóm thuốc chẹn thụ thể beta. Thuốc hoạt động bằng cách gây giãn mạch, làm giảm mạch máu, giúp tim bạn để tránh bơm máu đi khắp cơ thể, làm giảm huyết áp và sức căng ở tim.
Carsantin® được sử dụng để:

- Điều trị tăng huyết áp.
Điều trị đau thắt ngực ở bệnh nhân suy tim (xảy ra khi động mạch vành máu mang oxy đến tim bị hẹp gây thiếu oxy đến các cơ ở tim).
Phối hợp với các thuốc khác để điều trị hỗ trợ suy tim mạn tính ở bệnh nhân suy tim trung bình đến nặng.
Kiểm tra lại với bác sĩ hoặc được sĩ nếu bạn không chắc chắn về cách dùng thuốc.

LIÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO

Liên dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ hoặc được sĩ.
Kiểm tra lại với bác sĩ hoặc được sĩ nếu bạn không chắc chắn về cách dùng thuốc.

LIÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO

Liên dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ hoặc được sĩ.
Kiểm tra lại với bác sĩ hoặc được sĩ nếu bạn không chắc chắn về cách dùng thuốc.

LIÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO

Liên dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ hoặc được sĩ.
Kiểm tra lại với bác sĩ hoặc được sĩ nếu bạn không chắc chắn về cách dùng thuốc.

LIÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO

Liên dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ hoặc được sĩ.
Kiểm tra lại với bác sĩ hoặc được sĩ nếu bạn không chắc chắn về cách dùng thuốc.

LIÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO

Liên dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ hoặc được sĩ.
Kiểm tra lại với bác sĩ hoặc được sĩ nếu bạn không chắc chắn về cách dùng thuốc.

LIÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO

Liên dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ hoặc được sĩ.
Kiểm tra lại với bác sĩ hoặc được sĩ nếu bạn không chắc chắn về cách dùng thuốc.

Việc điều trị suy tim cần được bắt đầu và theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ chuyên khoa. Nếu bạn ngừng sử dụng Carsantin® trong vòng 2 tuần, cần bắt đầu lại với liều khởi đầu (3,125 mg/lần x 2 lần/ngày) và tăng liều dần như hướng dẫn. Mỗi sự tăng trọng, tình trạng suy tim có thể trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt trong giai đoạn khởi đầu điều trị làm tăng các triệu chứng như mệt mỏi, khó thở và các dấu hiệu giữ nước (tăng cân và sưng phù mắt, chân, mắt các triệu chứng và bệnh nặng hơn trong quá trình sử dụng Carsantin®, cần thông báo cho bác sĩ để được điều chỉnh liều của các thuốc đang dùng hoặc điều chỉnh liều Carsantin®

- + Trong quá trình điều trị với Carsantin®, cần tiếp tục duy trì các thuốc đang dùng theo hướng dẫn của bác sĩ.
- Bệnh nhân suy gan: Bác sĩ sẽ giảm liều phụ thuộc vào tình trạng bệnh của bạn.
- Trẻ em dưới 18 tuổi: Không sử dụng Carsantin® ở những đối tượng này.

CÁCH DÙNG

- Dùng đúng uống, sử dụng chung với thức ăn.
- Không được ngừng sử dụng Carsantin® đột ngột mà không thông báo cho bác sĩ. Việc ngừng sử dụng thuốc đột ngột sẽ gây ra các tác dụng không mong muốn. Bác sĩ sẽ hướng dẫn bạn cách ngừng thuốc dần trước khi ngừng thuốc hẳn. Nếu bạn đang sử dụng đồng thời thuốc chẹn calciomycin, không được ngừng bất kỳ thuốc nào trừ khi có hướng dẫn của bác sĩ.

KHINÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY

- Dùng với carvedilol hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Có tiền sử bị hen suyễn hoặc các bệnh khác ở phổi (như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tắc nghẽn phế quản).
- Ban được chẩn đoán bị suy tim nặng kèm theo phù dưng kẽ và đờ đờ điều trị với các thuốc thêm fính mạch.
- Có các bệnh về gan.
- Ban được chẩn đoán chậm nhịp tim nặng (<50 nhịp/phút).
- Hạ huyết áp nặng.
- Ban được chẩn đoán đau thắt ngực kiểu Prinzmetal.
- U ury huyết thần không điều trị (mọi khối u ở tuyến thượng thận gây tăng huyết áp mà không được điều trị).
- Mắc các rối loạn về cân bằng acid-base trong cơ thể (nhiễm acid chyunh toan).

- Rối loạn tuần hoàn động mạch ngoại biên nghiêm trọng (quá trình tuần hoàn máu ở chân và tay yếu, dẫn lạnh và đau).
- Ban có các bệnh về dẫn truyền ở tim (block nhĩ thất độ II hoặc III (trừ trường hợp đất máy tạo nhịp tại chỗ vĩnh viễn) hoặc hơi chngy yếu nút xoang).
- Đang sử dụng verapamil hoặc diltiazem tiêm tĩnh mạch trong điều trị tăng huyết áp hoặc các bệnh khác về tim.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Giống như các thuốc khác, Carsantin® có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn mà du không phải bệnh nhân nào cũng mắc phải.

Mức độ nghiêm trọng của các tác dụng không mong muốn thường phụ thuộc vào liều dùng và biến mất khi giảm liều hoặc ngừng điều trị. Một số tác dụng không mong muốn có thể xảy ra ở giai đoạn đầu của quá trình điều trị và từ thời điểm ngừng quá trình điều trị.

Rối loạn nhịp đập (có thể ảnh hưởng nhiều hơn 1 người trong 10 người): Chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, hạ huyết áp, suy tim.
Thường gặp (có thể ảnh hưởng 1 - 10 người trong 100 người): Viêm phế quản, viêm phổi, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, nhiễm khuẩn đường tiêu, giảm số lượng hồng cầu, tăng cân, tăng nồng độ cholesterol trong máu, mất kiểm soát đường huyết ở một số bệnh nhân đái tháo đường, trầm cảm, rối thần suy sụp, rối loạn thị giác, giảm tiết mồ hôi, khô mắt, nhitp tim chậm, phôi, ở domain, tăng thể tích máu trong cơ thể, hạ huyết áp thể đứng (chóng mặt khi đứng dậy đột ngột), các vấn đề về tuần hoàn máu (bao gồm các dấu hiệu lãnh chân và tay), xơ cứng động mạch, làm trầm trọng thêm bệnh Raynaud (các ngón tay hoặc ngón chân xanh xao, tái nhợt và sưng do trở nên đỏ, nóng hoặc chứng đau chi cách hơi lạnh (đau ở chân, trầm trọng hơn khi đi bộ), hen suyễn hoặc

các vấn đề về hô hấp, tích trữ dịch ở phổi; tiêu chảy; suy nhược, nôn mửa, đau bụng, khó tiêu; đau ở cánh tay và chân; suy thần cấp và rối loạn chức năng thần ở bệnh nhân xơ cứng động mạch hoặc suy giảm chức năng thần; tiêu chảy.

- H giảm (có thể ảnh hưởng 1 - 10 người trong 1000 người): Rối loạn giấc ngủ, lú lẫn, ngất, đi cảm, rối loạn dẫn truyền, đau thắt ngực; các phản ứng da (viêm da dị ứng, mày đay, ngứa, viêm da, tăng độ mỗ hỏ, vẩy nến), rụng tóc; bất lực.
- Hiếm gặp (có thể ảnh hưởng 1 - 10 người trong 10000 người): Giảm số lượng tiểu cầu; khô miệng; chảy nước mắt.
- Rất hiếm gặp (có thể ảnh hưởng ít hơn 1 người trong 10000 người): Giảm số lượng bạch cầu; phản ứng dị ứng; thay đổi chức năng gan; tiêu không thích soát ở phụ nữ.
- Nếu bạn gặp phải bất kỳ tác dụng không mong muốn nào, cần thông báo cho bác sĩ hoặc được sĩ, kể cả các tác dụng không được liệt kê ở mục này.

NÊN TRẦN DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC CHỨNG PHẨM

GIỚI HẠN SỬ DỤNG THUỐC NÀY

- Thông báo cho bác sĩ hoặc được sĩ những thuốc bạn đang hoặc vẫn sử dụng gần đây, bao gồm thuốc không kê đơn, vì Carsantin® có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc khác và ngược lại nếu sử dụng đồng thời:
- Thuốc điều trị loạn nhịp (diltiazem, verapamil hoặc amiodaron).
- Thuốc nitrat để điều trị đau thắt ngực (isosorbid mononitrat hoặc glyceryl trinitrat).
- Thuốc điều trị suy tim (digoxin).
- Các thuốc khác dùng để điều trị tăng huyết áp (doxazosin, reserpin, amiodipin hoặc indoramin).
- Thuốc điều trị trầm cảm hoặc các bệnh về rối loạn tâm thần (fluoxetin, thuốc chống trầm cảm ba vòng, barihiturat, phenothiazin, haloperidol hoặc thuốc ức chế monoamin oxidase).
- Thuốc sử dụng trong ghép cơ quan (cyclosporin).
- Thuốc làm giảm đường huyết (thuốc điều trị đái tháo đường dùng uống hoặc insulin).
- Thuốc làm giảm huyết áp hoặc điều trị đau nửa đầu (clonidin, ergotamin).
- Thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) dùng để điều trị viêm, giảm đau (ibuprofen, diclofenac).
- Liều pháp điều trị thay thế hormon (estrogen).
- Corticosteroid dùng để điều trị các bệnh viêm, dị ứng (prednisolon).
- Thuốc điều trị loét dạ dày, gờng, trào ngược acid (cimetidin).
- Thuốc điều trị nấm (ketocozazol).
- Thuốc điều trị sưng huyết mũi và cảm lạnh (ephedrin hoặc pseudoephedrin).
- Thông báo cho bác sĩ bạn đang sử dụng Carsantin® nếu bạn cần sử dụng thuốc gây tê gây mê để chuẩn bị phẫu thuật.

CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN DÙNG THUỐC

Nếu quên dùng thuốc, uống ngay sau khi nhớ ra. Nếu thời điểm nhớ ra gần với thời điểm uống liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên và tiếp tục uống liều tiếp theo như thường lệ. Không uống liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.

CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO

- Bảo quản thuốc ở nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.
- Không sử dụng thuốc sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên hộp thuốc hay vi thuốc.
- Không nên vứt bỏ thuốc vào nước thải hay rác sinh hoạt. Hỏi ý kiến được sĩ cách bỏ thuốc không sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU

Trong trường hợp quá liều, có thể gây hạ huyết áp nghiêm trọng, chậm nhịp tim, suy tim, sốc tim, ngưng tim. Cũng có thể xảy ra các vấn đề ở đường hô hấp, có thể phát phế quản, rối loạn nhịp tim, động kinh toàn thể.

CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CẢO

Không dùng thuốc quá liều khuyến cáo. Trong trường hợp sử dụng quá liều, cần thông báo ngay cho bác sĩ và đến bệnh viện gần nhất. Nên mang theo bao bì ngoài của thuốc để bác sĩ xác định được bạn đã sử dụng quá liều thuốc nào.

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY

- Ở bệnh nhân suy tim mạn tính, carvedilol được sử dụng chủ yếu với thuốc lợi tiểu, hoặc thuốc chế enzym chyunh angiotensin, glycosid tư tim và/hoặc thuốc giãn mạch. Việc khởi đầu điều trị nên đặt dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên khoa.
- Sử dụng Carsantin® có thể che giấu các triệu chứng và dấu hiệu hạ đường huyết. Vì vậy, bác sĩ cần kiểm soát đường huyết thường xuyên nếu bạn bị đái tháo đường, đặc biệt trong giai đoạn điều chỉnh liều.
- Carsantin® có thể che giấu dấu hiệu và triệu chứng của bệnh cường tuyến giáp.
- Carsantin® có thể làm khô mắt, thận trọng nếu bạn mang kính sát tròng.
- Phụ nữ mang thai: Do không có thông tin đầy đủ trên người, không sử dụng Carsantin® ở phụ nữ mang thai trừ khi có sự hướng dẫn của bác sĩ. Tham khảo ý kiến bác sĩ trong trường hợp bạn đang mang thai, nghỉ ngơi mình mang thai hoặc có kế hoạch mang thai.
- Phụ nữ cho con bú: Dựa theo các kết quả nghiên cứu trên động vật, thuốc có thể phân bố vào sữa mẹ. Vì vậy, người mẹ cho con bú không nên sử dụng Carsantin®. Tham khảo ý kiến bác sĩ trong trường hợp bạn đang cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc: Thuốc có thể gây giảm khả năng tinh táo và tập trung, đặc biệt trong giai đoạn đầu dùng thuốc hoặc khi điều chỉnh liều. Nếu xảy ra với bạn, không nên lái xe, vận hành máy móc, làm việc trên cao hoặc các trường hợp có thể gây nguy hiểm khác.

KHINÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ

- Người cao tuổi.
- Ban có các bệnh về tim.
- Ban đang mắc hoặc có tiền sử mắc các bệnh về gan, thận, đái tháo đường, tuyến giáp. Carvedilol có thể che giấu các dấu hiệu hạ đường huyết.
- Có các bệnh về tuần hoàn máu ở tay, chân hoặc hội chứng Raynaud.
- Có tiền sử mắc các phản ứng dị ứng nghiêm trọng hoặc điều trị bởi các tác nhân gây dị ứng bất kỳ dị ứng nghiêm trọng nào.
- Sử dụng kính sát tròng (vì carvedilol có thể gây khô mắt).
- Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc được sĩ.

HẠN DÙNG

36 tháng (kể từ ngày sản xuất).

NGAY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



MIBE CMBH ARZELIMED CÔNG TY TNHH HẠSÁN - ĐỀ MÀM PHARM
Sân xuất, thiết kế, phân phối và kinh doanh
CÔNG TY TNHH HẠSÁN - ĐỀ MÀM PHARM
Đường số 2, KCN Đông Anh, Phường Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội