

Dorithricin®

THROAT LOZENGES

DORITHRICIN®

Viên ngậm họng

Để thuốc ở xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

THÀNH PHẦN

Mỗi viên ngậm chứa:

Hoạt chất:	
Tyrothricin	0,5 mg
Benzalkonium clorid	1,0 mg
Benzocain	1,5 mg

Tá dược: Povidon K25, Sodium saccharin 2H₂O, Tinh dầu bạc hà, Sorbitol, Talc, Sucrose stearat Typ III, Carmelose sodium.

Bệnh nhân tiểu đường lưu ý: mỗi viên thuốc có chứa Sorbitol .870,7 mg

MÔ TẢ

Viên nén hai mặt phẳng, tròn, màu trắng, một mặt nhẵn và một mặt có khắc chữ "Dorithricin®".

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 2 vỉ x 10 viên ngậm

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ

Điều trị các triệu chứng nhiễm khuẩn miệng - họng như đau họng, nuốt khó.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng:

Ngậm 1-2 viên/lần, có thể dùng nhiều lần trong ngày, các lần cách nhau 2-3 giờ.

Cần tiếp tục điều trị thêm một ngày nữa sau khi đã hết các triệu chứng.

Cách dùng: ngậm để viên thuốc tan từ từ trong miệng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Không ngậm viên thuốc nếu có vết thương mới khá rộng trong miệng hoặc họng.

Bệnh nhân bị chứng di truyền hiếm gặp không dung nạp fructose không dùng thuốc này.

THẬN TRỌNG

Đối với tất cả các trường hợp bệnh nhân viêm amidan có mủ kèm theo sốt, bác sĩ nên quyết định ngoài việc sử dụng các thuốc điều trị cơ bản cần thiết như kháng sinh toàn thân, có cho bệnh nhân dùng viên ngậm Dorithricin® hay không.

Bệnh nhân bị viêm họng nặng hoặc đau họng kèm sốt cao, đau đầu, buồn nôn hoặc nôn, không nên sử dụng viên ngậm Dorithricin® quá 2 ngày mà không có tư vấn của nhân viên y tế.

Những bệnh nhân có khuynh hướng dễ bị dị ứng da (ví dụ chàm tiếp xúc dị ứng) có nguy cơ bị mẫn cảm với thuốc.

Bệnh nhân bị tiểu đường:

Lượng sorbitol thay thế đường trong một viên ngậm Dorithricin® tương đương với khoảng 0,07 BU.

DÙNG THUỐC CHO TRẺ EM

Vì không đảm bảo được trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ biết sử dụng thuốc đúng cách (cách ngậm thuốc), viên ngậm Dorithricin® không thích hợp cho các lứa tuổi này. Chỉ dùng viên ngậm cho trẻ em nếu trẻ biết cách ngậm thuốc đúng.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI HOẶC CHO CON BÚ

Hiện chưa có dữ liệu về sử dụng Dorithricin® trên phụ nữ có thai. Đối với hoạt chất benzalkonium clorid, các nghiên cứu trên chuột cho thấy một vài độc tính về sinh sản, nhưng chỉ khi sử dụng với liều cực kỳ cao (50-200 mg/kg cân nặng).

Do việc sử dụng liều rất cao và đường dùng đặc biệt trong nghiên cứu này, nên không có bằng chứng cho thấy những phát hiện này có bất kỳ sự liên quan lâm sàng nào khi sử dụng Dorithricin® trên người. Đối với tyrothricin và benzocain, các nghiên cứu trên động vật về độc tính sinh sản là không đầy đủ.

Dự đoán rằng không có ảnh hưởng nào tới trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ bú sữa mẹ vì mức hấp thu toàn thân của phụ nữ cho con bú đối với tyrothricin, benzalkonium clorid và benzocain là không đáng kể.

Không rõ tyrothricin, benzalkonium clorid hoặc benzocain có được tiết vào sữa mẹ hay không, nhưng ở liều điều trị của Dorithricin®, dự đoán rằng không có ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ bú sữa mẹ.

Cho đến nay, các nghiên cứu trên phụ nữ có thai hoặc cho con bú chưa đầy đủ, vì những khuyến cáo chung, chỉ nên sử dụng Dorithricin® cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú khi được bác sĩ tư vấn và cân nhắc nếu lợi ích mang lại vượt trội nguy cơ có thể xảy ra đối với thai nhi hoặc trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Viên ngậm Dorithricin® không có hoặc ảnh hưởng không đáng kể tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

Hiện vẫn chưa có tương tác nào được biết đến.