

XIN ĐỌC KÝ ĐƠN NÀY TRƯỚC KHI DÙNG THUỐC. GIỮ ĐƠN ĐỂ TRA CỨU KHI CẦN.

EYE DROPS
V.ROHTO®
DRY EYE



THUỐC NHỎ MẮT GIỮ ẨM
DÙNG CHO MẮT KHÔ, MĘT MỎI



Cấu tạo phim nước mắt:

Phim nước mắt là một màng mỏng, có nhiệm vụ bao phủ và bôi trơn bề mặt nhãn cầu. Phim nước mắt bao gồm 3 lớp: ngoài cùng là lớp mỡ (cấu trúc lipid), có chức năng ngăn ngừa nước mắt bốc hơi và đóng vai trò thiết yếu trong chất lượng của phim nước mắt. Ở giữa là lớp nước và trong cùng là lớp nhầy, có chức năng giữ cho lớp nước trải đều trên bề mặt nhãn cầu.

Phim nước mắt bảo vệ,
duy trì độ ẩm cho mắt



Mắt khô khiến
bề mặt giác mạc lộ ra



**ĐẶC TRƯNG
SẢN PHẨM**

- Bổ sung nước mắt nhầy tạo độ ẩm cần thiết cho mắt khô, mắt mệt mỏi.
- Làm dịu bề mặt giác mạc.
- Không chứa thành phần bảo quản.

Khô mắt là sự rối loạn của màng phim nước mắt (do nước mắt giảm tiết hoặc bốc hơi quá mức) gây tổn hại bề mặt nhãn cầu. V.Rohto Dryeye chứa Hydroxyethylcellulose (HEC) - hợp chất cao phân tử giúp tăng cường độ nhón, ngăn ngừa thành phần nước trong nước mắt bốc hơi, duy trì độ ẩm.

THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT (trong 1 ml)

Hydroxyethylcellulose (HEC) 75,0 mg

THÀNH PHẦN TÁ DƯỢC

Boric Acid, Sodium Chondroitin Sulfate, Sodium Borate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Edetate, Polysorbate 80, 1-Menthol, Nước tinh khiết.

V.ROHTO® DRY EYE

Thuốc nhỏ mắt

CHỈ ĐỊNH

Bổ sung nước mắt nhân tạo để tạo độ ẩm cho mắt khô, mắt mèo, mắt mờ (do có nhiều ghém), giảm cảm giác khó chịu khi sử dụng kính áp tròng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho người bị tăng nhãn áp và mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG

Nhỏ mắt mỗi lần 1 - 2 giọt, mỗi ngày 3 - 4 lần. Có thể nhỏ nhiều lần hơn nếu cần.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Hỏi ý kiến bác sĩ hay được sĩ trước khi dùng trong các trường hợp:

- Dùng theo một quá trình điều trị.
- Có tiền căn dị ứng với thuốc nhỏ mắt.
- Đau mắt nặng.
- Tăng nhãn áp.



- Trước khi dùng thuốc, chú ý:


- Tết am dùng thuốc dưới sự hướng dẫn của người lớn.
- Chỉ dùng thuốc này để nhỏ mắt.

- Ngưng dùng sản phẩm, đem tờ hướng dẫn này đến hỏi ý kiến bác sĩ hay được sĩ trong những trường hợp sau:

- Sau khi sử dụng:


Bộ phận liên quan	Triệu chứng
Mắt	Phát ban, mẩn đỏ, ngứa
Mũi	Đỏ, ngứa, sưng tấy, đau nhức

- Tình trạng mắt mèo không được cải thiện.
- Các triệu chứng không thuyên giảm sau 2 tuần sử dụng sản phẩm.



- Những lưu ý khi bảo quản và sử dụng:

- Vận chuyển nắp lật sau khi dùng.
- Bảo quản nơi khô mát (dưới 30 °C), tránh ánh nắng trực tiếp.
- Đảm bảo không lẫn và giảm chất lượng. Không đựng thuốc vào chai lọ khác.
- Không dùng chung lọ thuốc với người khác để tránh lây nhiễm.
- Một số hoạt chất có thể kết tinh ở miệng lọ do điều kiện bảo quản thuốc. Hãy lau miệng lọ bằng gạc sạch trước khi dùng. Không để mi mắt chạm vào miệng lọ để tránh nhiễm trùng hoặc làm vỡ đặc dung dịch.
- Không đổ dung dịch khác vào vỏ chai V.ROHTO DRY EYE để sử dụng.
- Sau khi mở nắp, nên sử dụng càng nhanh càng tốt vì thuốc có thể bị lây nhiễm trong khi sử dụng.
- Đeo dung dịch thuốc nhỏ mắt có độ nhạy cao để duy trì độ ẩm cho mắt, xin lưu ý sau khi nhỏ mắt sẽ thấy mắt có tình trạng mờ trong ngắn thời.



QUẢ LIỆU VÀ CÁCH XỬ LÝ

Dùng đúng liều quy định, nếu quá liều có thể gây xung huyết. Nếu xảy ra, ngưng sử dụng, và xin chỉ dẫn của bác sĩ hoặc được sĩ.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Trừ trường hợp có chỉ định của bác sĩ, tránh dùng cùng lúc với các loại thuốc nhỏ mắt khác.

TÁC DỤNG NGOẠI Y

Thuốc có thể gây dị ứng như ngứa mắt, xung huyết trong một số trường hợp.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 13 ml.

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để xa tầm tay trẻ em.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Bộ phận nhỏ mắt khách hàng

(028) 3822 9322

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00
(từ ngày 15/10/2019)

TELE: 028

ROHTO

www.rohto.com.vn

Sản xuất bởi:

CTY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)
Số 16 VĨNH; đường số 5, khu công nghiệp Tân Nam-Singapore,
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Trụ sở chính:
ROHTO PHARMACO, 808
GIAO ĐIỂM: 1000