

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ
EAGLE BRAND MUSCULAR BALM
CAO XOA CƠ BẮP CON Ó

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

“Để xa tầm tay trẻ em”

“Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”

Thành phần của thuốc:

Hoạt chất chính:

Methyl Salicylate..... 24,66 % kl/kl

Menthol..... 12,22 % kl/kl

Tá dược: White Soft Paraffin, Hard paraffin.

Dạng bào chế: CAO XOA (Thuốc dùng ngoài).

Quy cách đóng gói:

Hộp 1lọ 10 g.

Hộp 1lọ 20 g.

Chỉ định: Cao Xoa Cơ Bắp Con Ó có tác dụng làm giảm các cơn đau cơ như: đau vai, đau lưng, đau thắt lưng, đau khớp tay, khớp chân. Đối với các vận động viên, Cao Xoa Cơ Bắp Con Ó có thể được sử dụng như một loại dầu nóng.

Liều dùng và cách dùng: Day nhẹ vùng bị đau với thuốc. Bôi 3-4 lần mỗi ngày. Để cảm nhận được mùi đặc trưng của Cao Xoa Cơ Bắp Con Ó, đắp khăn nóng đã có sẵn thuốc lên vùng bị đau 2-3 giờ sau lần điều trị đầu tiên. Hơi nóng lan tỏa giúp cải thiện lưu thông máu.

Chống chỉ định: Không sử dụng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Không dùng cho vết thương hay vùng da bị trầy xước. Không sử dụng cho người bị dị ứng với Menthol, Salicylat hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc: Chỉ bôi ngoài da. Không được uống. Không dùng để băng bó vết thương. Không thoa lên mắt và niêm mạc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có báo cáo.

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Sản phẩm có chứa methyl salicylat, khi sử dụng có thể một lượng nhỏ hấp thu vào máu. Ở bệnh nhân đang sử dụng warfarin, nếu dùng nhiều có thể ảnh hưởng đến chức năng đông máu.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Đỏ da hay dị ứng da, mẩn ngứa, sưng phồng, phát ban có thể xảy ra, đặc biệt ở bệnh nhân da nhạy cảm. Nếu bôi thuốc trên diện rộng hay bôi vào vùng da bị tổn thương, thuốc có thể bị hấp thu.

Quá liều và cách xử trí: *Quá liều Methyl salicylat:* Nhiễm độc salicylat có thể xảy ra sau khi uống hoặc bôi methyl salicylat. Nhiễm độc mạn tính thường xảy ra khi sử dụng lặp lại liều lớn hoặc bôi quá nhiều salicylat. Các triệu chứng bao gồm: chóng mặt, ù tai, ra mồ hôi, buồn nôn, ói mửa, và rối loạn tâm thần. Các triệu chứng trên có thể được kiểm soát bằng cách giảm liều sử dụng. Các triệu chứng nhiễm độc nặng hoặc quá liều cấp tính sau ngộ độc bao gồm: tăng thông khí phổi, sốt, nhiễm ceton và nhiễm kiềm hô hấp và toan chuyển hóa. Suy nhược hệ thần kinh trung ương có thể dẫn đến hôn mê, trụy tim mạch và suy hô hấp.

Quá liều menthol: Nuốt phải một lượng lớn là nguyên nhân gây ra các triệu chứng: buồn nôn, nôn mửa, đau bụng dữ dội, chóng mặt, mất điều hòa vận động, mê sảng, giật cơ, co giật và cơn động kinh, trầm cảm và hôn mê. Có thể gây suy hô hấp tức thời cho trẻ nhỏ nếu xoa trực tiếp lên mũi.

Điều kiện bảo quản: Đóng nắp kín và bảo quản nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng của thuốc: 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không được dùng thuốc quá hạn sử dụng được ghi trên bao bì.

Nhà sản xuất: PT EAGLE INDO PHARMA, Jl. Prabu Siliwangi Km. 1, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatuiwung, Tangerang 15133, Indonesia.

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 27/3/2018

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH
EAGLE BRAND MUSCULAR BALM
CAO XOA CƠ BẮP CON Ó

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

“Để xa tầm tay trẻ em”

“Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”

Thành phần của thuốc:

Hoạt chất chính:

Methyl Salicylate..... 24,66 % kl/kl

Menthol..... 12,22 % kl/kl

Tá dược: White Soft Paraffin, Hard paraffin.

Mô tả sản phẩm: Cao xoa màu trắng, mùi đặc trưng.

Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ 10 g. Hộp 1lọ 20 g.

Thuốc dùng cho bệnh gì: Cao Xoa Cơ Bắp Con Ó có tác dụng làm giảm các cơn đau cơ như: đau vai, đau lưng, đau thắt lưng, đau khớp tay, khớp chân. Đối với các vận động viên, Cao Xoa Cơ Bắp Con Ó có thể được sử dụng như một loại dầu nóng.

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng? Day nhẹ vùng bị đau với thuốc. Bôi 3-4 lần mỗi ngày. Để cảm nhận được mùi đặc trưng của Cao Xoa Cơ Bắp Con Ó, đắp khăn nóng đã có sẵn thuốc lên vùng bị đau 2-3 giờ sau lần điều trị đầu tiên. Hơi nóng lan tỏa giúp cải thiện lưu thông máu.

Khi nào không nên dùng thuốc này? Không sử dụng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Không dùng cho vết thương hay vùng da bị trầy xước. Không sử dụng cho người bị dị ứng với Menthol, Salicylat hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Đỏ da hay dị ứng da có thể xảy ra, đặc biệt ở bệnh nhân da nhạy cảm. Nếu triệu chứng tiếp tục kéo dài hay da bị mẩn ngứa, sưng phồng hay bị phát ban, hãy thông báo cho bác sĩ của bạn. Nếu bôi thuốc trên diện rộng hay bôi vào vùng da bị tổn thương, thuốc có thể bị hấp thu. Hãy thông báo cho bác sĩ nếu bạn thấy: kêu trong tai, buồn nôn hay nôn.

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này? Sản phẩm có chứa methyl salicylat, khi sử dụng có thể một lượng nhỏ hấp thu vào máu. Ở bệnh nhân đang sử dụng warfarin, nếu dùng nhiều có thể ảnh hưởng đến chức năng đông máu.

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc? Xoa thuốc đều đặn lại theo lịch bình thường, không quá 3 đến 4 lần trong ngày.

Cần bảo quản thuốc này như thế nào? Đóng nắp kín và bảo quản nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C.

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: *Quá liều Methyl salicylat:* Nhiễm độc salicylat có thể xảy ra sau khi uống hoặc bôi methyl salicylat. Nhiễm độc mạn tính thường xảy ra khi sử dụng lặp lại liều lớn hoặc bôi quá nhiều salicylat. Các triệu chứng bao gồm: chóng mặt, ù tai, ra mồ hôi, buồn nôn, ói mửa, và rối loạn tâm thần. Các triệu chứng trên có thể được kiểm soát bằng cách giảm liều sử dụng. Các triệu chứng nhiễm độc nặng hoặc quá liều cấp tính sau ngộ độc bao gồm: tăng thông khí phổi, sốt, nhiễm ceton và nhiễm kiềm hô hấp và toan chuyển hóa. Suy nhược hệ thần kinh trung ương có thể dẫn đến hôn mê, trụy tim mạch và suy hô hấp. *Quá liều menthol:* Nuốt phải một lượng lớn là nguyên nhân gây ra các triệu chứng: buồn nôn, nôn mửa, đau bụng dữ dội, chóng mặt, mất điều hòa vận động, mê sảng, giật cơ, co giật và cơn động kinh, trầm cảm và hôn mê. Có thể gây suy hô hấp tức thời cho trẻ nhỏ nếu bôi dầu trực tiếp lên mũi.

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo? Ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sĩ càng sớm càng tốt ngay khi các triệu chứng trên xuất hiện.

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: Chỉ bôi ngoài da. Không được uống. Không dùng để băng bó vết thương. Không thoa lên mắt và niêm mạc. *Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:* Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú. Chỉ nên sử dụng sản phẩm khi thật cần thiết theo sự kê đơn của thầy thuốc. Hãy thảo luận với bác sĩ của bạn về nguy cơ và lợi ích của việc dùng thuốc trong thời gian có thai và cho con bú. *Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:* Chưa có báo cáo.

Khi nào cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ: Thông báo hoặc hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nếu có cơ địa dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Hạn dùng của thuốc: 60 tháng kể từ ngày sản xuất. **Không được dùng thuốc quá hạn sử dụng được ghi trên bao bì.**

Nhà sản xuất: PT EAGLE INDO PHARMA, Jl. Prabu Siliwangi Km. 1, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang 15133, Indonesia.

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 27/3/2018