


# MẪU NHÃN

1. Mẫu vỉ (vỉ 15 viên bao phim):



Số lô, HD đóng  
nổi trên vỉ




✓

2. Mẫu hộp (2 vỉ x 15 viên bao phim):



### 3.- MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:



| <b>FASVON</b><br>VIÊN BAO PHIM  |  |
|---|--|
| <b>THÀNH PHẦN:</b> Mỗi viên bao phim chứa: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hoạt chất chính:</b> Rutin.....500mg</li><li>• <b>Tá dược:</b> Tinh bột ngô, lactose, eragel, P.V.P, bột talc, magnesi stearat, D.S.T, aerosil, H.P.M.C, titan dioxyd, oxid sắt đỏ, oxid sắt vàng.</li></ul>  |  |
| <b>CHỈ ĐỊNH:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hỗ trợ tăng sức bền và giảm tính thấm mao mạch.</li><li>• Hỗ trợ Điều trị hội chứng chảy máu, xơ cứng, tăng huyết áp, ban xuất huyết, chứng giãn tĩnh mạch (phù, đau nặng chân, bệnh trĩ...).</li></ul>  |  |
| <b>CHỐNG CHỈ ĐỊNH:</b> Phụ nữ có thai.  |  |
| <b>LIỀU LƯỢNG &amp; CÁCH DÙNG:</b> Người lớn: uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.   |  |
| <b>TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:</b> Một số trường hợp xảy ra rối loạn tiêu hóa và rối loạn thần kinh thực vật nhẹ, không cần phải ngưng điều trị.  |  |
| <b>Ghi chú:</b> Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc  |  |
| <b>THẬN TRỌNG:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Phụ nữ nuôi con bú:</b> Do chưa có đầy đủ số liệu về khả năng thuốc qua được sữa mẹ, do đó thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.</li><li>• <b>Lái xe và vận hành máy móc:</b> (chưa có tài liệu)</li></ul>   |  |
| <b>TƯƠNG TÁC THUỐC:</b> Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ về những thuốc bạn đang sử dụng.  |  |
| <b>QUÁ LIỀU XỬ TRÍ:</b> Báo ngay cho bác sỹ khi dùng quá liều chỉ định  |  |
| <b>QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:</b> Hộp 2 vỉ x 15 viên bao phim.  |  |
| <b>BẢO QUẢN:</b> Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.  |  |
| <b>HẠN DÙNG:</b> 36 tháng kể từ ngày sản xuất.  |  |
| <b>TIÊU CHUẨN:</b> TCCS   |  |
| <b>CHÚ Ý:</b> Không sử dụng thuốc nếu: <ul style="list-style-type: none"><li>• Viên thuốc bị biến màu, nứt vỡ.</li><li>• Vỉ thuốc bị rách.</li><li>• Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sỹ khi gặp những triệu chứng dị ứng.</li><li>• Để xa tầm tay trẻ em.</li><li>• Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.</li></ul> |  |
|  <b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA</b><br>184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM<br>ĐT: (08) - 38440106 Fax: (84 - 8) - 38440446<br>Nhà máy sản xuất: Ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  |  |



PHÓ CỤC TRƯỞNG  
Nguyễn Văn Thanh

5000