

MẪU NHÃN DỰ KIẾN GEL XOA BÓP HIỆU CON GẤU

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 20/1/2019

THUỐC GEL DÙNG NGOÀI DA GMP - WHO

GEL XOA BÓP
HIỆU CON GẤU 10g

KHÔNG DÂY DINH - KHÔNG NHƠN - THẨM NHANH

Tiêu chuẩn: TCCS

Thành phần:

Methyl salicylat	1.5g	Chỉ định:
Menthol	0.7g	Giảm đau trong các trường hợp:
Tá dược vừa đủ	10g	Đau cơ, khớp, đau phong tê thấp, bong gân.

Cách dùng: Người lớn: bôi thuốc lên vùng đau 3-4 lần/ngày
Trẻ em: dưới 3 tuổi phải theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
40 Hùng Ngh - TP Đồng Hới - Quảng Bình - Việt Nam



2. MẪU NHÃN HỘP 1 TÚYP 10 G

THUỐC GEL DÙNG NGOÀI DA GMP - WHO

GEL XOA BÓP
HIỆU CON GẤU 10g

KHÔNG DÂY DINH - KHÔNG NHƠN - THẨM NHANH

SDK:

Thành phần:

Methyl salicylat	1.5g	Chỉ định:
Menthol	0.7g	Giảm đau trong các trường hợp:
Tá dược vừa đủ	10g	Đau cơ, khớp, đau phong tê thấp, bong gân.

Cách dùng: Người lớn: bôi thuốc lên vùng đau 3-4 lần/ngày
Trẻ em: dưới 3 tuổi phải theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
40 Hùng Ngh - TP Đồng Hới - Quảng Bình - Việt Nam

THUỐC GEL DÙNG NGOÀI DA GMP - WHO

GEL XOA BÓP
HIỆU CON GẤU 10g

KHÔNG DÂY DINH - KHÔNG NHƠN - THẨM NHANH

Tiêu chuẩn: TCCS

Chống chỉ định: Tránh bôi lên mắt, niêm mạc.
Không dùng cho vết thương hở hay vùng da bị thương.
Trẻ em dưới 2 tuổi.

Bảo quản: Để nơi khô ráo tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Số lô SX: []
Ngày SX: []
HD

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DÙNG



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Thuốc bôi ngoài da

GEL XOA BÓP HIỆU CON GẤU

Thành phần tính cho 1 tuýp thành phẩm (10g):

Thành phần	Hàm lượng
Methyl salicylat	1,5 g
Menthol	0,7 g
Carbopol 934	0,43 g
Propylen glycol	0,3 g
Isopropanol	1,25 g
Tinh dầu hoa hồng	0,001g
Ethanol 960	vừa đủ
	10 g

Các đặc tính dược lực học: Gel xoa bóp hiệu con gấu là sự kết hợp giữa methyl salicylat và menthol có tác dụng giảm đau

Các đặc tính dược động học: Thuốc dùng ngoài da có tác dụng tại chỗ.

Chỉ định: Giảm đau trong các trường hợp: Đau cơ, khớp, đau phong tê thấp, bong gân

Liều dùng - cách dùng:

- Người lớn: Bôi thuốc lên vùng bị đau 3-4 lần/ngày
- Trẻ em: Dưới 3 tuổi phải theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Chống chỉ định:

- Tránh bôi lên mắt, niêm mạc.
- Không dùng cho vết thương hở hay vùng da bị tổn thương.
- Trẻ em dưới 2 tuổi.

Thận trọng:

- Tránh bôi lên mắt, niêm mạc.
- Không dùng cho vết thương hở hay vùng da bị tổn thương.
- Không bôi lên vùng vú khi đang nuôi con bú.

Tác dụng không mong muốn (ADR):

Khi dùng ngoài ít có tác dụng phụ. Nếu có hiện tượng mẫn cảm với thuốc phải ngừng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc

Tương tác thuốc: Chưa thấy

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Chưa có nghiên cứu cụ thể cho trường hợp phụ nữ có thai và cho con bú. Tuy nhiên, cần thận trọng khi dùng cho các đối tượng này

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Dùng được cho người lái xe và vận hành máy móc

Sử dụng quá liều: Chưa thấy

Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 g.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C.

Tiêu chuẩn áp dụng: Theo tiêu chuẩn cơ sở.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

“ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC “

Nhà sản xuất và phân phối:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Đường Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: 052.3822346 - 3 822475. Fax: 052.3820720.

Ngày 20 tháng 04 năm 2012

C.TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

