

MEKOLACTAGIL

Viên bao đường

CÔNG THỨC:

Tảo *Spirulina platensis* tương đương protein.....120mg
 Tá dược vừa đủ.....1 viên
 (Talc, Povidone, Sodium starch glycolate, Dicalcium phosphate, Microcrystalline cellulose, Ethanol 96%, Đường trắng, Gôm Arabic, Methyl hydroxybenzoate, Propyl hydroxybenzoate, Gôm Lacque, Màu Peppermint, Màu Tartrazine, Sáp ong, Paraffin, Dầu thầu dầu).

TÍNH CHẤT:

- MEKOLACTAGIL được bào chế từ tảo Spirulina - một loại vi tảo có dạng xoắn hình lò xo, màu xanh - chứa các thành phần dinh dưỡng như protein, glucide, vitamin (B₁, B₂, B₆, B₁₂, E, Beta Caroten (tiền chất vitamin A)) và khoáng chất (Calcium, Đồng, Sắt, Kali, Magnesium, Natri, Phospho, Kẽm) cần thiết cho sức khỏe con người. MEKOLACTAGIL đã được thử nghiệm lâm sàng ở bệnh viện phụ sản Từ Dũ và cho kết quả khả quan:

- + MEKOLACTAGIL làm tăng thể tích sữa được tiết ra ở các sản phụ sinh thường lẫn sản phụ sinh mổ. Sữa vẫn đầy đủ các thành phần dinh dưỡng và kháng thể cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Trẻ vẫn phát triển đều trong giới hạn bình thường.
- + MEKOLACTAGIL cần thiết cho các sản phụ nhiễm khuẩn sau khi mổ, mất sữa.
- + Nếu ngừng uống MEKOLACTAGIL thì lượng sữa giảm đi 40%.
- Hiệu suất tiêu hóa, hấp thụ và sử dụng protein của Spirulina trong cơ thể rất cao: sau 18 giờ, hơn 85% protein của Spirulina được tiêu hóa và sử dụng.

CHỈ ĐỊNH:

- Cung cấp protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho các bà mẹ sau khi sinh.
- Kích thích làm tăng lượng sữa tiết ra ở các bà mẹ đang cho con bú, kể cả trường hợp sinh mổ.

CÁCH DÙNG:

- Uống 1 - 2 viên/lần, ngày 2 lần.
- Các sản phụ bị mất sữa do sinh mổ: uống 2 viên/lần, ngày 3 lần.

Thời gian sử dụng trung bình là 2 tháng. Nếu ngưng thuốc, lượng sữa giảm thì có thể tiếp tục uống thêm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Không nên dùng tảo Spirulina một lần với lượng quá cao trong mọi trường hợp, nên chia đều trong ngày để hoạt chất vừa dễ được hấp thu vừa không gây gánh nặng cho gan, thận.

THỜI KỲ MANG THAI-CHO CON BÚ:

Sử dụng được cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Qua nghiên cứu lâm sàng chưa thấy có tác dụng ngoại ý, ngay cả đối với những bệnh nhân có nhược điểm về hệ tiêu hóa, gan mật.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa thấy có tương tác với các thuốc khác.

QUÁ LIỀU & CÁCH XỬ TRÍ:

- Tảo Spirulina khó gây ngộ độc do tích lũy vì hoạt chất trong tảo vừa dễ dung nạp, vừa dễ được đào thải nếu thặng dư.

- Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

HẠN DÙNG:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:

Nơi khô (độ ẩm ≤ 70%), nhiệt độ ≤ 30°C, tránh ánh sáng.

TRÌNH BÀY:

- Vỉ 10 viên bao đường. Hộp 2 vỉ.
- Vỉ 10 viên bao đường. Hộp 3 vỉ.

Sản xuất theo TCCS

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam