


MẪU NHÃN HỘP VÀ VỈ SẢN PHẨM MEMLOBA



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 17/12/2015

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN
Số 521, An Lạc, và Hoa Lư, H. Bến Cát, T. Bình Dương
ĐT: 0650 3589036 - FAX: 0650 3589297

Memloba

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:
Cao khô bạch quả 40 mg

(Tương đương 1,4 g dược liệu)
Tá dược: Dầu đậu nành, Lecithin, Sáp ong, Gelatin, Sorbitol liquid, Glycerin, Vanillin, Methyl paraben, Titan dioxide, Oxyd sắt đen, Green-S, vừa đủ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị rối loạn tuần hoàn máu não và ngoại biên.
 - Giảm chủ ý lặp trung, giảm trí nhớ, mất trí do xơ cứng mạch máu não và các tình trạng xảy ra sau đột quỵ.
 - Rối loạn tuần hoàn máu và rối loạn thần kinh ở tai: ù tai, chóng mặt, điếc bất ngờ.
 - Rối loạn tuần hoàn máu và rối loạn thần kinh ở mắt: rối loạn thị giác, bệnh võng mạc do tiểu đường, thoái hóa hoàng điểm ở người già.
 - Điều trị triệu chứng đau nhức của bệnh tắc động mạch chi dưới mạn tính (tê lạnh tay chân, kiến bò).
 - Cải thiện hội chứng Raynaud.
- CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, LIỀU DÙNG-CÁCH DÙNG VÀ CÁCH THÔNG TIN KHÁC:**
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
BẢO QUẢN:
Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

ĐỂ XÀ TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC
KHI DÙNG

Memloba

Cao khô bạch quả 40 mg



6 vỉ x 10 viên nang mềm

SPK: XXXX

Ngày SX: :
Lô SX: :

HD:

KEEP OUT THE REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE INSTRUCTION
BEFORE USE

Pharmaceutical Joint Stock Company
No 521, An Lạc, Hoa Lư, Bến Cát, Bình Dương
TEL: 0650 3589036 - FAX: 0650 3589297

GMP - WHO

Memloba

Ginkgo biloba Extract 40 mg



6 blisters x 10 softgels

VISA XXXX

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ

Dạng bào chế: Viên nang mềm

MEMLOBA

TRÌNH BÀY: Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm

CÔNG THỨC

- Cao khô bạch quả (Ginkgo biloba Extract).....40 mg
(tương đương 1,4 g dược liệu)
- Tá dược (Dầu đậu nành, Lecithin, Sáp ong, Gelatin, Sorbitol liquid, Glycerin, Vanilin, Methyl paraben, Titan dioxyd, Oxyd sắt đen, Green-S), vừa đủ 1 viên.

DƯỢC LỰC HỌC

- Phân hủy các gốc tự do: Thuốc có tác dụng phân hủy các gốc tự do trong cơ thể và ức chế sự tạo thành các lipid peroxide. Vì thế bảo vệ màng tế bào tránh khỏi hàng loạt các tổn hại gây ra bởi các gốc tự do.
- Cải thiện sự tưới máu: Thuốc có tác dụng làm giảm độ nhớt máu và làm tăng độ đàn hồi của hồng cầu và bạch cầu do đó cải thiện được vi và đại tuần hoàn.
- Bảo vệ mô: Thuốc có tác dụng làm tăng cung cấp glucose và oxygen đến các mô bị thiếu máu. Thuốc cũng làm tăng mật độ receptor dẫn truyền thần kinh như receptor muscarinic, adrenergic và serotonergic.
- Điều hoà trương lực mạch máu: Thuốc có tác động duy trì trương lực động mạch và tĩnh mạch thông qua việc thúc đẩy phóng thích catecholamine và ức chế sự thoái biến, làm giãn động mạch thông qua sự thúc đẩy sự sản sinh prostacylin và EDRF.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

- Hoạt chất chính là chiết xuất tiêu chuẩn hóa của Ginkgo biloba được chuẩn độ có 24% heterosides của Ginkgo, 6% di và sesquiterpene (ginkgolides A, B, C và bilobalide).
- Ở người, chỉ có những thông số dược động học của các thành phần terpen là đã được làm rõ.
- Các ginkgolide A và B và bilobalide có độ khả dụng sinh học qua đường uống là 80 đến 90%. Đạt nồng độ tối đa sau 1 đến 2 giờ, quá trình bán thanh thải kéo dài khoảng 4 giờ (bilobalide, ginkgolide A) đến 10 giờ (ginkgolide B).
- Các chất này không bị phân giải trong cơ thể và chủ yếu được thải ra qua nước tiểu, một lượng nhỏ được thải qua phân

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị rối loạn tuần hoàn máu não và ngoại biên.
- Giảm chú ý tập trung, giảm trí nhớ, mất trí do xơ cứng mạch máu não và các tình trạng xảy ra sau đột quy.

- Rối loạn tuần hoàn máu và rối loạn thần kinh ở tai: ù tai, chóng mặt, điếc bất ngờ.
- Rối loạn tuần hoàn máu và rối loạn thần kinh ở mắt: rối loạn thị giác, bệnh võng mạc do tiểu đường, thoái hóa hoàng điểm ở người già.
- Điều trị triệu chứng đau cách hồi của bệnh tắc động mạch chi dưới mạn tính (tê lạnh tay chân, kiến bò).
- Cải thiện hội chứng Raynaud.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nhân mẫn cảm với thành phần của thuốc.
- Thời kỳ tai biến mạch máu não cấp tính.
- Nhồi máu cơ tim cấp tính.
- Người đang chảy máu, rối loạn chảy máu.
- Suy giảm trí nhớ do thiếu năng não bẩm sinh, thần kinh phân liệt.
- Hạ huyết áp.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.
- Trẻ em dưới 12 tuổi.

LIỀU DÙNG

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: liều thông thường: 1 viên x 3 lần/ngày, hay 2 viên x 2 lần/ngày.
- Rối loạn chức năng não: 1-2 viên x 3 lần/ngày, hay 2 viên x 2-3 lần/ngày.
- Chóng mặt: 1 viên x 3-4 lần/ngày, hay 2 viên x 1-2 lần/ngày.

Uống trong bữa ăn, nuốt trọn viên thuốc.

Hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

- Thuốc chống co giật: liều cao MEMLOBA có thể làm giảm hiệu quả điều trị ở bệnh nhân đang điều trị bằng carbamazepine hay acid valproic.
- Thuốc chống đông máu (aspirin, clopidogrel, dipyridamole, heparin, ticlopidine, warfarin): không nên phối hợp vì MEMLOBA cũng có tính chất làm loãng máu.
- Thuốc ức chế IMAO: MEMLOBA có thể làm tăng tác dụng của các thuốc chống trầm cảm như phenelzine, tranlycypromine.


THẬN TRỌNG

MEMLOBA không phải là thuốc hạ huyết áp, và không thể dùng để điều trị thay thế cho các thuốc chống cao huyết áp đặc trị. Rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc chống đông máu.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN VẬN HÀNH MÁY MÓC VÀ LÁI XE:



Thuốc không gây buồn ngủ nên có thể dùng cho người lái xe và vận hành máy móc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ LÝ

Chưa có thông tin về quá liều. Không có thông tin tham khảo đáng tin cậy và không có các thông báo từ dữ liệu thử nghiệm.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Hiếm khi bị rối loạn dạ dày-ruột, đặc biệt là cơ địa dị ứng, rối loạn tuần hoàn (tụt huyết áp, choáng váng, nhức đầu, vài trường hợp cá biệt rối loạn nhịp tim) hay bị dị ứng da.

Thông báo với bác sĩ các tác dụng không muốn gặp phải của thuốc

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng quá hạn ghi trên bao bì

TIÊU CHUẨN: TCCS số 0650-B-024-07

Logo công ty: **MEDISUN**

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN

Địa chỉ nhà sản xuất: 521 An Lợi, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3589036 – Fax: 0650 3589297

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Giám đốc cơ sở đăng ký thuốc



DS. Lê Minh Hoàn



**TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG**
Nguyễn Thị Thu Thủy