

BỘ Y TẾ  
 CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
 ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 4/3/15

**Thành phần]** Mỗi viên nang chứa  
 Mecobalamin.....500µg

**[Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác]**  
 Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

**[Bảo quản]** Trong hộp kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C

**[Đóng gói]** 10 viên nang/vi, 10 vỉ/hộp

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM  
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

SĐK:  
 Số là SX:  
 NSX:  
 HD:  
 DNNK:

For peripheral neuropathy

**MERABIN CAP**

Mecobalamin 500µg

100Caps



Sản xuất bởi:  
**DAEWOO PHARM. CO., LTD.**  
 153, Dadae-ro, Saha-gu, Busan, Hàn Quốc

**MERABIN CAP**

Mecobalamin 500µg

**[Composition]** Each capsule contains  
 Mecobalamin.....500µg

**[Indications]**  
 Peripheral neuropathies, Megaloblast anemia due to vitamin B12 deficiency.

**[Dosage & Administration]**  
 Usual adult dose: 3 Capsules daily in divided doses of 3 times.  
 Adjust the dose according to age and symptom.

**[Contraindications and other information]** Please see the insert-paper

**[Storage]** Protected from light, tight-containers, at temperature below 30°C

**[Package]** 10 Caps/bi-ster, 10 Blisters/box

*Handwritten signature*



For peripheral neuropathy

**MERABIN CAP**

Mecobalamin 500µg

100Caps



Sản xuất bởi:  
**DAEWOO PHARM. CO., LTD.**  
 153, Dadae-ro, Saha-gu, Busan, Korea


**MERABIN CAP**  
 Mecobalamin 500µg



*Handwritten signature*

NHÃN VÌ: **MERABINCAP**

“Số lô, HD được dập trên vỉ”



3. Package insert:

*Đề xa tâm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.*

## MERABINCAP

(Mecobalamin 500 $\mu$ g)

### THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang chứa:

*Hoạt chất:* Mecobalamin ..... 500 $\mu$ g

*Tá dược:* Tinh bột ngô, Lactose monohydrat, Magnesi stearat.

### DẠNG BẢO CHẾ

Viên nang cứng.

### CHỈ ĐỊNH

Bệnh lý thần kinh ngoại biên, thiếu máu nguyên hồng cầu không lồ do thiếu vitamin B<sub>12</sub>.

### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn: liều thông thường là 3 viên mỗi ngày, chia làm 3 lần.

Liều có thể được điều chỉnh theo độ tuổi và triệu chứng bệnh.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không được dùng viên nang MERABINCAP cho những bệnh nhân bị quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. U ác tính.

### THẬN TRỌNG

Không nên dùng thuốc quá một tháng nếu thấy thuốc không cho kết quả tốt.

Tránh dùng Mecobalamin trong thời gian dài và liều cao ở bệnh nhân tiếp xúc với thủy ngân và chế phẩm của nó.

### TƯƠNG TÁC THUỐC

Các thuốc neomycin, acid aminosalicylic, thuốc kháng Histamin H<sub>2</sub> và Colchicine có thể làm giảm sự hấp thu vitamin B<sub>12</sub> từ đường tiêu hóa. Nồng độ thuốc trong huyết thanh có thể giảm khi dùng đồng thời với các thuốc ngừa thai đường uống.

### PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chưa có các nghiên cứu về độ an toàn khi sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú, do đó sử dụng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú khi đã cân nhắc lợi ích của việc điều trị và nguy cơ có thể xảy ra.

### ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Tiêu hoá: chán ăn, buồn nôn, nôn.

Da: phát ban có thể xảy ra, nhưng hiếm gặp.

*Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc*

### QUÁ LIỀU

Chưa có báo cáo về quá liều. Thuốc giải độc đặc hiệu chưa được biết.

**BẢO QUẢN:** Giữ thuốc trong hộp kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

**THỜI HẠN SỬ DỤNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng*

**ĐÓNG GÓI:** Hộp 10 vi x 10 viên.

Sản xuất bởi:

DAEWOO PHARM. CO., LTD.

153, Dadae-ro, Saha-gu, Busan, Hàn Quốc



*Nguyễn Việt Hùng*  
PHÓ CỤC TRƯỞNG  
*Nguyễn Việt Hùng*

*Nguyễn Suk Ji*