

Rx Thuốc bán theo đơn  
Để xa tầm tay trẻ em.  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần  
thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

# PHILEO Eye Drops

SDK: VN-18733-15

## [Thành phần]

Mỗi ml chứa

Hoạt chất:

Levofloxacin ..... 5mg

Tá dược:

Natri clorid, acid hydrochloric, Natri hydroxyd,  
Nước pha tiêm.

## [Dược học học]

Levofloxacin là đồng phân L-isomer của Ofloxacin, một kháng sinh nhóm quinolone và có hoạt lực mạnh gấp 2 lần Ofloxacin. Cơ chế tác dụng của Levofloxacin là do ức chế topoisomerase IV và DNA gyrase (cả hai đều là topoisomerase II) là các enzyme cần thiết cho quá trình nhân lên, sao chép, sửa chữa và tái tổ hợp DNA của vi khuẩn.

Trên *in vitro*, Levofloxacin có phổ tác dụng rộng đối với các chủng vi khuẩn Gram dương và Gram âm và nồng độ thuốc có tác dụng diệt khuẩn tương đương hoặc cao hơn chút ít so với nồng độ ức chế vi khuẩn. Trong cả *in vitro* và nhiễm khuẩn lâm sàng, Levofloxacin có tác dụng đối với hầu hết các chủng vi khuẩn.

## [Dược động học]

Nồng độ trung bình của Levofloxacin trong nước mắt dao động trong khoảng từ 34,9-221,2 $\mu$ g/ml sau 60 phút nhỏ thuốc. Nồng độ trung bình của Levofloxacin trong nước mắt do được sau 4 giờ nhỏ thuốc là 17,0 $\mu$ g/ml, và sau 6 giờ là 6,6 $\mu$ g/ml.

## [Chi định]

Thuốc được chỉ định trong viêm mịn mắt, viêm bờ mi, viêm tuyến lệ, viêm kết mạc, viêm giác mạc, loét giác mạc, sỏi khuẩn trong khi mổ mắt.

## [Liều lượng và cách dùng]

Ngày 1 và ngày 2: Nhỏ 1 đến 2 giọt vào mắt bị nhiễm khuẩn mỗi 2 giờ một lần, 3 lần/ngày.  
Ngày 3 đến ngày 7: Nhỏ 1 đến 2 giọt vào mắt bị nhiễm khuẩn mỗi 4 giờ một lần, 4 lần/ngày.

## [Chống chỉ định]

Bệnh nhân mẫn cảm với Levofloxacin, kháng sinh nhóm Quinolon hay bất kỳ thành phần nào của thuốc.

## [Thận trọng]

Cùng như các thuốc kháng khuẩn khác, sử dụng lâu dài có thể gây ra sự phát triển của các chủng vi khuẩn không nhạy cảm khác, bao gồm cả nấm. Nếu có sự tái nhiễm xảy ra, không nên sử dụng thuốc và thay thế bằng một liệu pháp điều trị khác.

Không chạm đầu nhô giọt vào bất kỳ bề mặt nào vì có thể làm hỏng dung dịch thuốc.

Đối với những bệnh nhân đeo kính áp tròng, phải bỏ kính áp tròng trước khi sử dụng thuốc và chỉ đeo lại sau khi đã dùng thuốc 30 phút.

## THUỐC KHÔNG ĐƯỢC TIÊM. CHỈ SỬ DỤNG TRONG NHÂN KHOA.

Cần thận trọng khi sử dụng thuốc, không để đầu ống thuốc tiếp xúc với mắt để tránh thuốc bị nhiễm khuẩn.

Không nên dùng thuốc đã hết hạn. Chỉ dùng thuốc trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp.

## [Tương tác thuốc]

Không có tương tác thuốc của dạng nhỏ mắt nào được ghi nhận. Tuy nhiên đối với dạng đóng toàn thân của vài Quinolon khác thì gặp một số tương tác sau: Làm tăng nồng độ Theophyllin trong huyết tương, ngăn chặn sự chuyển hóa của Caffein, tăng tác dụng chống đông máu của Warfarin dạng uống và các dẫn chất của nó.

## [Sử dụng thuốc ở phụ nữ mang thai và cho con bú]

**Phụ nữ có thai:** Độ an toàn của thuốc ở phụ nữ mang thai chưa được xác định. Do đó, chỉ nên dùng thuốc cho đối tượng này khi các lợi ích do thuốc mang lại nhiều hơn nguy cơ cho thai.

**Phụ nữ cho con bú:** Levofloxacin có khả năng được phân bố vào sữa mẹ. Cần thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú.

## [Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc]

Không nên dùng thuốc khi đang lái xe và vận hành máy móc.

## [Tác dụng không mong muốn]

Các tác dụng không mong muốn được ghi nhận là giảm thị lực, sỏi, cảm giác có vật lạ, đau đầu, nồng rát mắt thoáng qua, đau hoặc khó chịu ở mắt, viêm họng và sổ ánh sáng (chiếm 1-3%).

Các phản ứng khác như phản ứng dị ứng, sưng mí mắt, khô mắt và ngứa mắt (dưới 1%).

\* **Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.**

## [Quá liều]

Quá liều thuốc nhỏ mắt levofloxacin là rất hiếm khi xảy ra. Triệu chứng quá liều sau tác dụng không mong muốn. Nếu quá liều xảy ra, bệnh nhân cần rửa mắt bằng nước ấm sạch và điều trị triệu chứng.

## [Đóng gói]

3ml/lọ, 1 lọ/hộp.

## [Hạn dùng]

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

\* **Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.**

## [Bảo quản]

Trong hộp kín, nơi khô mát, dưới 30°C,

tránh ánh nắng.

Sản xuất bởi:  
**SAMCHUNDANG PHARM CO., LTD.**  
71, Jeyak-gongdan 2-gil, Hyangnam-eup,  
Hwasong-si, Gyeonggi-Do, Hàn Quốc

