

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
NOCID

THÀNH PHẦN: Mỗi viên NOCID chứa:

D,L- α -ketoisoleucin calci	67 mg
α -ketoleucin calci	101 mg
α -ketophenylalanin calci	68 mg
α -ketovalin calci	86 mg
D,L- α -hydroxymethionin calci.....	59 mg
L-Lysin acetat	105 mg
L-Tryptophan	23 mg
L-Threonin	53 mg
L-Histidin	38 mg
L-Tyrosin	30 mg

(Tổng lượng nitơ mỗi viên 36 mg, tổng lượng calci mỗi viên 50 mg).

Các thành phần khác: Croscarmellose natri, phẩm màu opadry white AMB OY-B-28920 tổng hợp, hydroxypropyl cellulose, polyethylen glycol, natri lauryl sulfat, chất làm bóng talc, tinh bột ngô, Hydroxypropyl methylcellulose, colloidal silicon dioxyd, phẩm màu D&C Yellow 10 Al Lake tổng hợp, phẩm màu FDC Lake Yellow No. 6 tổng hợp.

MÔ TẢ: Viên nén bao phim NOCID chứa các acid amin -ketoacid và calci. Tổng lượng nitơ trong mỗi viên là 36 mg và tổng lượng calci mỗi viên là 50 mg.

CÔNG DỤNG

Bổ sung acid amin cho cơ thể.

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Người bị suy thận.

CÁCH DÙNG

Người lớn uống 4 đến 8 viên 1 lần, ngày 3 lần trong bữa ăn (cho người có thể trọng 70kg) hoặc theo hướng dẫn của nhân viên y tế

CẢNH BÁO

- Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Không dùng cho người bị tăng calci máu, rối loạn chuyển hóa acid amin, phenylketon niệu di truyền.
- Nên uống NOCID trong bữa ăn để các acid amin được hấp thu và chuyển hóa tốt nhất. Nên định kỳ kiểm tra nồng độ calci máu. Cần đảm bảo nguồn dinh dưỡng cung cấp đủ năng lượng.
- Không dùng đồng thời NOCID với các thuốc mà độ hòa tan bị ảnh hưởng bởi calci (như tetracyclin, ciprofloxacin, norfloxacin, sắt, flo và các thuốc có chứa estramustin) do gây ảnh hưởng đến sự hấp thu của các thuốc này. Nên uống NOCID cách xa các thuốc trên ít nhất 2 giờ.
- Do các triệu chứng của urê huyết được cải thiện khi sử dụng NOCID, cần giảm liều nhôm hydroxyd, cần theo dõi sự giảm nồng độ phosphat huyết thanh
- Chưa có nghiên cứu về độ an toàn khi dùng NOCID cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- Có thể xảy ra tăng calci máu. Trong trường hợp này cần giảm lượng vitamin D ăn vào. Nếu calci máu vẫn tăng, cần giảm liều NOCID và hạn chế bổ sung calci từ các nguồn dinh dưỡng khác. Cần theo dõi nồng độ calci định kỳ.

BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐÓNG GÓI: Hộp 100 viên nén bao phim 815 mg (10 vỉ x 10 viên x 815 mg).

Nhà sản xuất: **PT. KALBE FARMA Tbk.**

Jl. M.H. Thamrin Blok A3-1 Kawasan Industri Delta Silikon, Lippo
Cikarang – Bekasi, Indonesia

